

## いわき市医療センター がん化学療法レジメン一覧

| レジメンコード          | 分類     | レジメン名称                       | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|------------------|--------|------------------------------|--|-----|
| J84-01<br>J84-02 | 間質性肺炎  | 間質性肺炎 シクロフォスファミド             | <p>【1クール 7～14日間】</p> <p>1日目<br/>① シクロフォスファミド(エンドキサン)注 500mg/m<sup>2</sup>【1～2時間 点滴静注】</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>1～2週間ごとに実施</p> |     |
| K50-01<br>K50-91 | クローン病  | クローン病 インフリキシマブ (5mg/kg)      | <p>① インフリキシマブ注(レミケード) 5mg/kg<br/>【初回～3回は2時間、それ以降は点滴速度短縮可能 点滴静注】</p> <p>1日目 ⇒ 15日目 ⇒ 43日目 ⇒ 以降8週間隔で投与</p>   |     |
| K50-03<br>K50-92 | クローン病  | クローン病 インフリキシマブ (10mg/kg)     | <p>① インフリキシマブ注(レミケード) 10mg/kg<br/>【初回～3回は2時間、それ以降は点滴速度短縮可能 点滴静注】</p>   |     |
| K51-01<br>K51-93 | 潰瘍性大腸炎 | 潰瘍性大腸炎 インフリキシマブ (5mg/kg)     | <p>① インフリキシマブ注(レミケード) 5mg/kg<br/>【初回～3回は2時間、それ以降は点滴速度短縮可能 点滴静注】</p> <p>1日目 ⇒ 15日目 ⇒ 43日目 ⇒ 以降8週間隔で投与</p>   |     |
| M06-01           | 関節リウマチ | 関節リウマチ インフリキシマブ (初回 3mg/kg)  | <p>① インフリキシマブ注(レミケード) 3mg/kg<br/>【初回は3時間 2回目以降は2時間 点滴静注】</p> <p>1日目 ⇒ 15日目 ⇒ 43日目 ⇒ 以降8週間隔で投与</p> <p>※ メソトレキセート製剤と併用します。</p>                     |     |
| M06-02           | 関節リウマチ | 関節リウマチ インフリキシマブ (維持期 5mg/kg) | <p>【1クール 8週間】 5mg/kg</p> <p>① インフリキシマブ注(レミケード) 5mg/kg【1～2時間 点滴静注】</p> <p>※ メソトレキセート製剤と併用します。<br/>※ 病状により最短4週間毎まで投与間隔を短縮する場合があります。</p>            |     |

| レジメコード           | 分類        | レジメ名称                            | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄 |
|------------------|-----------|----------------------------------|---|-----|
| M06-03           | 関節リウマチ    | 関節リウマチ インフリキシマブ<br>(維持期 10mg/kg) | 【1クール 8週間】<br>① インフリキシマブ注(レミケード) 10mg/kg【1～2時間 点滴静注】<br>※ メトトレキサート製剤と併用します。<br>※ 病状により最短4週間毎まで投与間隔を短縮する場合があります。   |     |
| M06-04           | 関節リウマチ    | 関節リウマチ トシリズマブ                    | 【1クール 4週間】<br>① トシリズマブ注(アクテムラ) 8mg/kg【1～2時間 点滴静注】   |     |
| M08-05<br>M08-06 | 若年性特発性関節炎 | 多関節型若年性特発性関節炎<br>トシリズマブ          | 【1クール 4週間】<br>① トシリズマブ注(アクテムラ) 8mg/kg【1～2時間 点滴静注】   |     |
| M82-01<br>M82-02 | 若年性特発性関節炎 | 全身型若年性特発性関節炎<br>トシリズマブ           | 【1クール 2週間】<br>① トシリズマブ注(アクテムラ) 8mg/kg【1～2時間 点滴静注】   |     |
| O01-01           | 絨毛性疾患     | 絨毛性疾患 メトトレキサート                   | 1～5日目 連日<br>① メトトレキサート注 0.4mg/kg【筋肉注射】  |     |
| O01-03           | 絨毛性疾患     | 絨毛性疾患 アクチノマイシンD                  | 1～5日目 連日<br>① アクチノマイシンD(コスメゲン)注 0.01mg/kg【5分 点滴静注】  |     |
| C15-01           | 食道癌       | 食道癌 5-FU+ネダプラチン                  | 【1クール 28日間】<br>1日目<br>① フルオロウラシル(5-FU)注 400mg/m <sup>2</sup> 【24時間持続静注】<br>+ネダプラチン 90mg/m <sup>2</sup> 【2時間】<br>2～5日目<br>② フルオロウラシル(5-FU)注 400mg/m <sup>2</sup> 【24時間持続静注】<br>※ 放射線併用時は、照射1週目と6週目に行います。 |     |

| レジメンコード | 分類  | レジメン名称              | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|---------|-----|---------------------|--|-----|
| C15-02  | 食道癌 | 食道癌 5-FU+シスプラチン     | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① フルオロウラシル(5-FU)注 400mg/m<sup>2</sup>【24時間持続静注】<br/>                     +シスプラチン 80mg/m<sup>2</sup>【2時間】</p> <p>2～5日目<br/>                     ② フルオロウラシル(5-FU)注 400mg/m<sup>2</sup>【24時間持続静注】</p> <p>※投与前後に十分な水分を静注します。また、吐気止めのお薬を使用します。</p>   |     |
| C15-03  | 食道癌 | 食道癌 5-FU+シスプラチン+放射線 | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① フルオロウラシル(5-FU)注 350mg/m<sup>2</sup>【24時間持続静注】<br/>                     +シスプラチン注 70mg/m<sup>2</sup>【2時間】</p> <p>2～4日目<br/>                     ② フルオロウラシル(5-FU)注 350mg/m<sup>2</sup>【24時間持続静注】</p> <p>※ 投与前後に十分な水分を点滴します。また、吐気止めのお薬を使用します。<br/>                     ※ 放射線療法を併用します。</p> |     |
| C15-6   | 食道癌 | 食道癌 mFOLFOX 6       | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>+オキサリプラチン注 85mg/m<sup>2</sup><br/>                     【同時に120分】</p> <p>② フルオロウラシル(5-FU) ※急速静注 400mg/m<sup>2</sup> 【約5分程度】</p> <p>③ フルオロウラシル(5-FU) 2400mg/m<sup>2</sup>【46時間持続投与】</p> <p>※ ③は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。</p>                               |     |

| レジメンコード | 分類  | レジメン名称            | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄                         |
|---------|-----|-------------------|---|-----------------------------|
| C15-7   | 食道癌 | 食道癌 mFOLFOX 6+放射線 | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>+オキサリプラチン注 85mg/m<sup>2</sup><br/>【同時に120分】</p> <p>② フルオロウラシル(5-FU) ※急速静注 400mg/m<sup>2</sup> 【約5分程度】</p> <p>③ フルオロウラシル(5-FU) 1600mg/m<sup>2</sup> 【46時間持続投与】</p> <p>※ ③は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。<br/>※ 放射線療法を併用します。</p> |                             |
| C15-11  | 食道癌 | 食道癌 ドセタキセル        | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ドセタキセル注 70mg/m<sup>2</sup> 【60分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>3週間毎に実施</p>  |                             |
| C15-20  | 食道癌 | 食道癌 ニボルマブ(2週毎)    | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ニボルマブ(オプジーボ)注 240mg【1時間】</p> <p>↓</p> <p>15日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ    |
| C15-21  | 食道癌 | 食道癌 ニボルマブ(4週毎)    | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ニボルマブ(オプジーボ)注 480mg【1時間】</p> <p>↓</p> <p>29日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ    |
| C15-22  | 食道癌 | 食道癌 ペムブロリズマブ(3週毎) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペムブロリズマブ(キイトルーダ)注 200mg【30分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |

| レジメンコード | 分類  | レジメン名称            | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄  |
|---------|-----|-------------------|---|--|
| C15-23  | 食道癌 | 食道癌 ペムブロリズマブ(6週毎) | <p>【1クール 42日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ペムブロリズマブ(キイトルーダ)注 400mg【30分】<br/>                     ↓<br/>                     43日目から同様に実施</p> | <p>【免疫チェックポイント阻害薬】<br/>                     ペムブロリズマブ</p> |

| レジメンコード          | 分類  | レジメン名称                       | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄                         |
|------------------|-----|------------------------------|--|-----------------------------|
| C15-24           | 食道癌 | 食道癌 3週毎 ペムブロリズマブ+シスプラチン+5-FU | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ペムブロリズマブ(キイトルーダ)注 200mg【30分】<br/>                     ② フルオロウラシル(5-FU)注 400mg/m<sup>2</sup>【24時間持続静注】<br/>                     ③ + シスプラチン注 80mg/m<sup>2</sup>【2時間】</p> <p>2～5日目<br/>                     ④ フルオロウラシル(5-FU)注 400mg/m<sup>2</sup>【24時間持続静注】<br/>                     ↓<br/>                     22日目から同様に実施</p> <p>※腎障害予防のために十分な水分を静注します。また、吐気止めのお薬を使用します。</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C15-25           | 食道癌 | 食道癌 6週毎 ペムブロリズマブ+シスプラチン+5-FU | <p>【1クール 42日間】</p> <p>◆ 1日目<br/>                     ① ペムブロリズマブ(キイトルーダ)注 400mg【30分】<br/>                     ② フルオロウラシル(5-FU)注 400mg/m<sup>2</sup>【24時間持続静注】<br/>                     ③ + シスプラチン注 80mg/m<sup>2</sup>【2時間】<br/>                     ◆ 2～5日目<br/>                     ④ フルオロウラシル(5-FU)注 400mg/m<sup>2</sup>【24時間持続静注】<br/>                     ◆ 22～26日目<br/>                     上記、②・③・④を実施します。<br/>                     ↓<br/>                     43日目から同様に繰り返します</p> <p>※腎障害予防のために十分な水分を静注します。また、吐気止めのお薬を使用します。</p> | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C15-26<br>C15-27 | 食道癌 | 食道癌 2週毎 ニボルマブ+シスプラチン+5-FU    | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ニボルマブ(オプジーボ)注 240mg【30分】<br/>                     ② フルオロウラシル(5-FU)注 400mg/m<sup>2</sup>【24時間持続静注】<br/>                     ③ + シスプラチン注 80mg/m<sup>2</sup>【2時間】</p> <p>2～5日目<br/>                     ④ フルオロウラシル(5-FU)注 400mg/m<sup>2</sup>【24時間持続静注】</p> <p>15日目<br/>                     ⑤ ニボルマブ(オプジーボ)注 240mg【30分】</p> <p>※腎障害予防のために十分な水分を静注します。また、吐気止めのお薬を使用します。</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ    |

| レジメンコード | 分類  | レジメン名称                    | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄   |
|---------|-----|---------------------------|--|---|
| C15-28  | 食道癌 | 食道癌 4週毎 ニボルマブ+シスプラチン+5-FU | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ニボルマブ(オブジーボ)注 480mg【30分】<br/>                     ② フルオロウラシル(5-FU)注 400mg/m<sup>2</sup>【24時間持続静注】<br/>                     ③ + シスプラチン注 80mg/m<sup>2</sup>【2時間】</p> <p>2～5日目<br/>                     ④ フルオロウラシル(5-FU)注 400mg/m<sup>2</sup>【24時間持続静注】</p> <p>※腎障害予防のために十分な水分を静注します。また、吐気止めのお薬を使用します。</p> | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ  |
| C15-29  | 食道癌 | 食道癌 ニボルマブ+イピリムマブ          | <p>【1クール 42日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ニボルマブ(オブジーボ)注 360mg【30分】<br/>                     ② イピリムマブ(ヤーボイ)注 1mg/kg【30分】</p> <p>21日目<br/>                     ① ニボルマブ(オブジーボ)注 360mg【30分】</p> <p>※ ①を投与後、30分間経過観察をします</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ、イピリムマブ   |
| C16-04  | 胃癌  | 胃癌 2週毎 イリノテカン             | <p>【1クール 49日間】</p> <p>1日目・15日目・29日目<br/>                     ① イリノテカン注 150mg/m<sup>2</sup>【90分】<br/>                     ↓<br/>                     2週間毎に3回投与し3週間休薬します。</p>  |   |
| C16-06  | 胃癌  | 胃癌 S-1+ドセタキセル             | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ドセタキセル注 40mg/m<sup>2</sup>【1時間】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)<br/>                     ② S-1(ティーエスワン または エスワンタイホウ)<br/>                     40～60mg/回【1日2回 14日間内服し、7日間休薬】<br/>                     ↓<br/>                     22日目から同様に実施</p>   | <p>&lt;S-1の投与量&gt;</p> <p>体表面積&lt;1.25: 40mg/回 ×2<br/>                     1.25≤体表面積&lt;1.5: 50mg/回 ×2<br/>                     1.5≤体表面積: 60mg/回 ×2</p> |

| レジメンコード | 分類 | レジメン名称            | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄  |
|---------|----|-------------------|--|--|
| C16-08  | 胃癌 | 胃癌 3週毎 S-1+シスプラチン | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① シスプラチン注 60mg/m<sup>2</sup>【120分】（前後に十分な補液を点滴します）</p> <p>1～14日目（1日目の夕食後から14日目の朝食後まで）<br/>② S-1（ティーエスワンまたは エスワンタイホウ）<br/>40～60mg/回【1日2回内服し、7日間休薬】<br/>↓<br/>22日目から同様に実施</p>  | <p>&lt;S-1の投与量&gt;</p> <p>体表面積&lt;1.25： 40mg/回 × 2<br/>1.25≤体表面積&lt;1.5： 50mg/回 × 2<br/>1.5≤体表面積： 60mg/回 × 2</p> |
| C16-09  | 胃癌 | 胃癌 5週毎 S-1+シスプラチン | <p>【1クール 35日間】</p> <p>1～21日目（1日目の夕食後から21日目の朝食後まで）<br/>① S-1（ティーエスワンまたは エスワンタイホウ）<br/>40～60mg/回【1日2回内服し、14日間休薬】</p> <p>8日目<br/>② シスプラチン注 60mg/m<sup>2</sup>【120分】（前後に十分な補液を点滴します）<br/>↓<br/>36日目から同様に実施</p> | <p>&lt;S-1の投与量&gt;</p> <p>体表面積&lt;1.25： 40mg/回 × 2<br/>1.25≤体表面積&lt;1.5： 50mg/回 × 2<br/>1.5≤体表面積： 60mg/回 × 2</p> |
| C16-10  | 胃癌 | 胃癌 ドセタキセル         | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① ドセタキセル注 60mg/m<sup>2</sup>【60分】</p>  |  |
| C16-11  | 胃癌 | 胃癌 毎週 パクリタキセル     | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・8・15日目<br/>① パクリタキセル注 80mg/m<sup>2</sup>【60分】</p> <p>1週間ごとに3回点滴静注し、2週間休薬します。</p>   |  |



| レジメンコード          | 分類 | レジメン名称                   | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄   |
|------------------|----|--------------------------|--|---|
| C16-13           | 胃癌 | 胃癌 トラスツズマブ単独             | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① トラスツズマブ注 60mg/kg【30分】</p> <p>※ 副作用が出た場合、投与時間が延びる場合があります。</p>   |   |
| C16-14           | 胃癌 | 胃癌 3週毎 アブラキサン            | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① アブラキサン注 260mg/m<sup>2</sup>【30分】</p>   |   |
| C16-15<br>C16-16 | 胃癌 | 胃癌 トラスツズマブ+S-1+シスプラチン    | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① トラスツズマブ注【初回90分】 8mg/kg【何もなければ2回目以降は30分】<br/>② シスプラチン注 60mg/m<sup>2</sup>【120分】</p> <p>1～14日目（1日目の夕食後から15日目の朝食後まで）<br/>③ S-1（ティーエスワン または エスワンタイホウ）<br/>40～60mg/回【1日2回 14日間内服し、7日間休薬】<br/>↓</p> <p>22日目から同様に実施<br/>※ 投与前後に十分な水分を点滴します。 また、吐気止めのお薬を使用します。</p> | <p>&lt;S-1の投与量&gt;</p> <p>体表面積&lt;1.25: 40mg/回 × 2<br/>1.25≦体表面積&lt;1.5: 50mg/回 × 2<br/>1.5≦体表面積: 60mg/回 × 2</p>  |
| C16-17<br>C16-18 | 胃癌 | 胃癌 トラスツズマブ+カペシタビン+シスプラチン | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① トラスツズマブ注 8mg/kg【初回90分】<br/>6mg/kg(2回目以降)【何もなければ2回目以降は30分】<br/>② シスプラチン注 80mg/m<sup>2</sup>【120分】</p> <p>1～14日目（1日目の夕食後から15日目の朝食後まで）<br/>③ カペシタビン（ゼローダ錠） 1000mg/m<sup>2</sup>/回【1日2回内服し、7日間休薬】<br/>↓</p>  | <p>&lt;カペシタビン(ゼローダ錠)投与量&gt;</p> <p>体表面積<br/>1.36㎡未満(1200mg/回) × 2<br/>1.36-1.66㎡未満(1500mg/回) × 2<br/>1.66-1.96㎡未満(1800mg/回) × 2<br/>1.96㎡以上(2100mg/回) × 2</p> |

| レジメンコード          | 分類 | レジメン名称            | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄   |
|------------------|----|-------------------|---|---|
|                  |    |                   | 22日目から同様に実施<br>※ 投与前後に十分な水分を点滴します。 また、吐気止めのお薬を使用します。  |   |
| C16-19<br>C16-20 | 胃癌 | 胃癌 オキサリプラチン+S-1   | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① オキサリプラチン注 100mg/m<sup>2</sup> or 130mg/m<sup>2</sup>【120分 点滴静注】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)<br/>② S-1(ティーエスワン または エスワンタイホウ)<br/>40～60mg/回【1日2回 14日間内服し、7日間休薬】</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>22日目から同様に実施</p> | <p>&lt;S-1の投与量&gt;</p> <p>体表面積&lt;1.25 : 40mg/回 × 2<br/>1.25≦体表面積&lt;1.5 : 50mg/回 × 2<br/>1.5≦体表面積 : 60mg/回 × 2</p> |
| C16-21           | 胃癌 | 胃癌 ラムシルマブ+パクリタキセル | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・15日目<br/>① ラムシルマブ(サイラムザ注) 8mg/kg【60分】<br/>(ラムシルマブ初回投与は投与後60分間経過をみて、次の注射に移ります。2～4回目は15分間経過をみます。)</p> <p>② パクリタキセル注 80mg/m<sup>2</sup>【60分】</p> <p>8日目<br/>③ パクリタキセル注 80mg/m<sup>2</sup>【60分】</p> <p>※ 16～28日目は休薬期間</p>                     |   |
| C16-22           | 胃癌 | 胃癌 ラムシルマブ単独       | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・15日目<br/>① ラムシルマブ(サイラムザ)注 8mg/kg【60分】<br/>(ラムシルマブ4回目までは投与後に、60分間、経過観察します)</p> <p>※ 16～28日目は休薬期間</p>   |   |

| レジメコード | 分類 | レジメ名称                 | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄   |
|--------|----|-----------------------|--|---|
| C16-23 | 胃癌 | 胃癌 オキサリプラチン+カベシタビン    | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① オキサリプラチン注 130mg/m<sup>2</sup>【120分 点滴静注】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)<br/>② カベシタビン錠(ゼローダ錠)<br/>1000mg/m<sup>2</sup>/回【1日2回 14日間内服し、7日間休薬】<br/>↓<br/>22日目から同様に実施</p>                                 | <p>&lt;カベシタビン(ゼローダ錠)投与量&gt;</p> <p>体表面積<br/>1.36㎡未満(1200mg/回) × 2<br/>1.36-1.66㎡未満(1500mg/回) × 2<br/>1.66-1.96㎡未満(1800mg/回) × 2<br/>1.96㎡以上(2100mg/回) × 2</p> |
| C16-24 | 胃癌 | 胃癌 ラムシルマブ+アブラキサン      | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・15日目<br/>① ラムシルマブ(サイラムザ注) 8mg/kg【60分】<br/>(ラムシルマブ初回投与は投与後60分間経過をみて、次の注射に移ります。2～4回目は15分間経過をみます。)<br/>② アブラキサン注 100mg/m<sup>2</sup>【30分】</p> <p>8日目<br/>③ アブラキサン注 100mg/m<sup>2</sup>【30分】</p> <p>※ 16～28日目は休薬期間</p> |   |
| C16-25 | 胃癌 | 胃癌 mFOLFOX 6          | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① レボホリナート注+オキサリプラチン注 85mg/m<sup>2</sup>【同時に120分】<br/>② フルオロウラシル(5-FU) ※急速静注 400mg/m<sup>2</sup>【約5分程度】<br/>③ フルオロウラシル(5-FU) 2400mg/m<sup>2</sup>【46時間持続投与】</p> <p>※ ③は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。</p>         |   |
| C16-26 | 胃癌 | 胃癌 3週毎 S-1+シスプラチン(外来) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① シスプラチン注 60mg/m<sup>2</sup>【60分】 (前後に十分な補液を点滴します)</p> <p>② S-1(ティーエスワン または エスワンタイホウ)<br/>40～60mg/回【1日2回内服し、7日間休薬】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から14日目の朝食後まで)<br/>↓<br/>22日目から同様に実施</p>                             | <p>&lt;S-1の投与量&gt;</p> <p>体表面積&lt;1.25 : 40mg/回 × 2<br/>1.25≤体表面積&lt;1.5 : 50mg/回 × 2<br/>1.5≤体表面積 : 60mg/回 × 2</p>   |

| レジメンコード                              | 分類 | レジメン名称                     | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄   |
|--------------------------------------|----|----------------------------|---|---|
| C16-27                               | 胃癌 | 胃癌 5週毎 S-1+シスプラチン(外来)      | <p>【1クール 35日間】</p> <p>1～21日目 (1日目の夕食後から21日目の朝食後まで)</p> <p>① S-1(ティーエスワン または エスワンタイホウ)<br/>40～60mg/回 【1日2回内服し、14日間休薬】</p> <p>8日目</p> <p>② シスプラチン注 60mg/m<sup>2</sup>【60分】 (前後に十分な補液を点滴します)</p> <p>↓</p> <p>36日目から同様に実施</p>   | <p>&lt;S-1の投与量&gt;</p> <p>体表面積&lt;1.25: 40mg/回 × 2</p> <p>1.25≤体表面積&lt;1.5: 50mg/回 × 2</p> <p>1.5≤体表面積: 60mg/回 × 2</p>  |
| C16-32<br>C16-33<br>C16-34<br>C16-35 | 胃癌 | 胃癌 トラスツズマブ+オキサリプラチン+S-1    | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① トラスツズマブ注 8mg/kg【初回90分】<br/>6mg/kg(2回目以降)【何もなければ2回目以降は30分】</p> <p>② オキサリプラチン注 100mg/m<sup>2</sup> or 130mg/m<sup>2</sup>【120分 点滴静注】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)</p> <p>② S-1(ティーエスワン または エスワンタイホウ)<br/>40～60mg/回 【1日2回 14日間内服し、7日間休薬】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p> | <p>&lt;S-1の投与量&gt;</p> <p>体表面積&lt;1.25: 40mg/回 × 2</p> <p>1.25≤体表面積&lt;1.5: 50mg/回 × 2</p> <p>1.5≤体表面積: 60mg/回 × 2</p>  |
| C16-36<br>C16-37                     | 胃癌 | 胃癌 トラスツズマブ+オキサリプラチン+カペシタビン | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① トラスツズマブ注 8mg/kg【初回90分】<br/>6mg/kg(2回目以降)【何もなければ2回目以降は30分】</p> <p>② オキサリプラチン注 130mg/m<sup>2</sup>【120分 点滴静注】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)</p> <p>② カペシタピン錠(ゼローダ錠)<br/>1000mg/m<sup>2</sup>/回 【1日2回 14日間内服し、7日間休薬】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>                      | <p>&lt;カペシタビン(ゼローダ錠)投与量&gt;</p> <p>体表面積</p> <p>1.36m<sup>2</sup>未満(1200mg/回) × 2</p> <p>1.36-1.66m<sup>2</sup>未満(1500mg/回) × 2</p> <p>1.66-1.96m<sup>2</sup>未満(1800mg/回) × 2</p> <p>1.96m<sup>2</sup>以上(2100mg/回) × 2</p> |

| レジメンコード | 分類 | レジメン名称                     | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄  |
|---------|----|----------------------------|--|--|
| C16-38  | 胃癌 | 胃癌 トラスツズマブ デルクステカン (エンハーツ) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① トラスツズマブ デルクステカン注 (エンハーツ)<br/>6.4mg/kg 【初回90分】 【何もなければ2回目以降は30分】</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>  |  |
| C16-50  | 胃癌 | 胃癌 ニボルマブ(2週毎)              | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① ニボルマブ(オブジーボ)注 【30分】 240mg</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>15日目から同様に実施</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ   |
| C16-51  | 胃癌 | 胃癌 ニボルマブ(4週毎)              | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>① ニボルマブ(オブジーボ)注 【30分】 480mg</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>29日目から同様に実施</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ   |
| C16-52  | 胃癌 | 胃癌 3週毎 ニボルマブ+オキサリプラチン+S-1  | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① ニボルマブ(オブジーボ)注 360mg【30分】(終了後、30分経過観察)<br/>② オキサリプラチン注 130mg/m<sup>2</sup>【120分 点滴静注】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)<br/>③ S-1 (ティーエスワン または エスワンタイホウ)<br/>40～60mg/回【1日2回 14日間内服し、7日間休薬】</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>22日目から同様に実施<br/>※ 吐気止めの点滴もあります</p> | <p>&lt;S-1の投与量&gt;</p> <p>体表面積&lt;1.25 : 40mg/回 × 2<br/>1.25≤体表面積&lt;1.5 : 50mg/回 × 2<br/>1.5≤体表面積 : 60mg/回 × 2</p> <p>【免疫チェックポイント阻害薬】<br/>ニボルマブ</p> |

| レジメンコード          | 分類 | レジメン名称                       | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄   |
|------------------|----|------------------------------|--|---|
| C16-53           | 胃癌 | 胃癌 3週毎 ニボルマブ+オキサリプラチン+カベシタピン | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ニボルマブ(オプジーボ)注 360mg【30分】(終了後、30分経過観察)<br/>                     ② オキサリプラチン注 130mg/m<sup>2</sup>【120分 点滴静注】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)<br/>                     ③ カベシタピン錠(ゼローダ錠) 1000mg/m<sup>2</sup>/回 【1日2回 14日間内服し、7日間休薬】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施<br/>                     ※ 吐気止めの点滴もあります</p>   | <p>&lt;カベシタピン(ゼローダ錠)投与量&gt;</p> <p>体表面積<br/>                     1.36㎡未満(1200mg/回) × 2<br/>                     1.36-1.66㎡未満(1500mg/回) × 2<br/>                     1.66-1.96㎡未満(1800mg/回) × 2<br/>                     1.96㎡以上(2100mg/回) × 2</p> <p>【免疫チェックポイント阻害薬】<br/>                     ニボルマブ</p> |
| C16-54           | 胃癌 | 胃癌 2週毎 ニボルマブ+mFOLFOX6        | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ニボルマブ(オプジーボ)注 240mg【30分】(終了後、30分経過観察)<br/>                     ② レボホリナート注+オキサリプラチン注 85mg/m<sup>2</sup>【同時に120分】<br/>                     ③ フルオロウラシル(5-FU) ※急速静注 400mg/m<sup>2</sup>【約5分程度】<br/>                     ④ フルオロウラシル(5-FU) 2400mg/m<sup>2</sup>【48時間持続投与】</p> <p>※ ④は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。</p> <p>↓</p> <p>15日目から同様に実施<br/>                     ※ 吐気止めの点滴もあります</p>             | <p>【免疫チェックポイント阻害薬】<br/>                     ニボルマブ</p>   |
| C16-60<br>C16-61 | 胃癌 | 胃癌 ゾルベツキシマブ+CapeOX           | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ゾルベツキシマブ(ビロイ)注<br/>                     初回800mg/m<sup>2</sup> 2回目以降600mg/m<sup>2</sup><br/>                     【有害事象の発現を確認しながら 点滴静注】<br/>                     ② オキサリプラチン注 130mg/m<sup>2</sup>【120分 点滴静注】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)<br/>                     ③ カベシタピン錠(ゼローダ錠)1000mg/m<sup>2</sup>/回<br/>                     【1日2回 14日間内服し、7日間休薬】</p> <p>※有害事象を予防するための薬剤を投与します。</p> | <p>&lt;カベシタピン(ゼローダ錠)投与量&gt;</p> <p>体表面積<br/>                     1.36㎡未満(1200mg/回) × 2<br/>                     1.36-1.66㎡未満(1500mg/回) × 2<br/>                     1.66-1.96㎡未満(1800mg/回) × 2<br/>                     1.96㎡以上(2100mg/回) × 2</p>   |

| レジメンコード          | 分類  | レジメン名称                | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|------------------|-----|-----------------------|--|-----|
| C16-62<br>C16-63 | 胃癌  | 胃癌 ゾルベツキシマブ+mFOLFOX 6 | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ゾルベツキシマブ(ビロイ)注<br/>初回800mg/m<sup>2</sup> 2回目以降400mg/m<sup>2</sup><br/>【有害事象の発現を確認しながら 点滴静注】</p> <p>② レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>+オキサリプラチン注 85mg/m<sup>2</sup><br/>【同時に120分】</p> <p>③ フルオロウラシル注(5-FU) 400mg/m<sup>2</sup> ※急速静注【約5分程度】</p> <p>④ フルオロウラシル注(5-FU) 2400mg/m<sup>2</sup> 【46時間持続投与】</p> <p>※ ④は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。<br/>※ 有害事象を予防するための薬剤を投与します。</p> |     |
| C18-02           | 大腸癌 | 大腸癌 5-FU/LV2          | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>【120分】</p> <p>② フルオロウラシル注(5-FU) 400mg/m<sup>2</sup>急速静注 【約5分程度】</p> <p>③ フルオロウラシル注(5-FU) 2400mg/m<sup>2</sup>【46時間持続投与】</p> <p>※ ③は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。</p>   |     |
| C18-03           | 大腸癌 | 大腸癌 5-FU/LV2+ベバシズマブ   | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ベバシズマブ注(アバスチン) 5mg/kg<br/>【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>② レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>【2時間】</p> <p>③ フルオロウラシル注(5-FU) 400mg/m<sup>2</sup> 急速静注 【約5分程度】</p> <p>④ フルオロウラシル注(5-FU) 2400mg/m<sup>2</sup>【46時間持続投与】</p> <p>↓</p> <p>2週間毎実施</p> <p>※ ④は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。</p>  |     |

| レジメンコード          | 分類  | レジメン名称               | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄 |
|------------------|-----|----------------------|---|-----|
| C18-04<br>C18-05 | 大腸癌 | 大腸癌 イリノテカン+セツキシマブ    | <p>【1クール 49日間】</p> <p>1・8・15・22・29・36・43 日目</p> <p>① セツキシマブ注(アービタックス)<br/>※初回と2回目以降は投与量・時間が変更になります<br/>初回 400mg/m<sup>2</sup> 2回目以降 250mg/m<sup>2</sup>【初回120分、2回目以降60分】</p> <p>1・15・29 日目</p> <p>② イリノテカン注 150mg/m<sup>2</sup>【90分】<br/>↓<br/>50日目以降に同様に実施</p>   |     |
| C18-06           | 大腸癌 | 大腸癌 mFOLFOX 6        | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>+オキサリプラチン注 85mg/m<sup>2</sup>【同時に120分】</p> <p>② フルオロウラシル(5-FU) 400mg/m<sup>2</sup> ※急速静注【約5分程度】</p> <p>③ フルオロウラシル(5-FU) 2400mg/m<sup>2</sup>【46時間持続投与】</p> <p>※ ③は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。</p>   |     |
| C18-07           | 大腸癌 | 大腸癌 mFOLFOX6+ペバシズマブ  | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペバシズマブ注(アバステン)<br/>5mg/kg【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>② レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>+オキサリプラチン注 85mg/m<sup>2</sup>【同時に120分】</p> <p>③ フルオロウラシル注(5-FU) 400mg/m<sup>2</sup> ※急速静注【約5分程度】</p> <p>④ フルオロウラシル注(5-FU) 2400mg/m<sup>2</sup>【46時間持続投与】</p> <p>※ ④は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。</p>                          |     |
| C18-08<br>C18-09 | 大腸癌 | 大腸癌 mFOLFOX 6+セツキシマブ | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① セツキシマブ注(アービタックス)<br/>※初回と2回目以降は投与量・時間が変更になります<br/>初回400mg/m<sup>2</sup> 2回目以降250mg/m<sup>2</sup>【初回120分、2回目以降60分】</p> <p>② レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>+オキサリプラチン注 85mg/m<sup>2</sup> 【同時に120分】</p> <p>③ フルオロウラシル注(5-FU) 400mg/m<sup>2</sup> ※急速静注【約5分程度】</p> <p>④ フルオロウラシル注(5-FU) 2400mg/m<sup>2</sup>【46時間持続投与】</p> |     |



| レジメンコード | 分類  | レジメン名称               | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|---------|-----|----------------------|--|-----|
|         |     |                      | <p>8日目</p> <p>⑤ セツキシマブ注(アービタックス) 250mg/m<sup>2</sup>【60分】</p> <p>※ ④は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。</p>  |     |
| C18-10  | 大腸癌 | 大腸癌 mFOLFOX 6+パニツムマブ | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① パニツムマブ注(ベクティビックス) 6mg/kg【60分】</p> <p>② レポホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>+オキサリプラチン注 85mg/m<sup>2</sup>【同時に120分】</p> <p>③ フルオロウラシル注(5-FU) 400mg/m<sup>2</sup> ※急速静注【約5分程度】</p> <p>④ フルオロウラシル注(5-FU) 2400mg/m<sup>2</sup>【46時間持続投与】</p> <p>↓</p> <p>2週間毎実施</p> <p>※ ④は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。</p>                |     |
| C18-11  | 大腸癌 | 大腸癌 FOLFIRI          | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① レポホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>+イリノテカン注 150mg/m<sup>2</sup>【同時に120分】</p> <p>② フルオロウラシル注(5-FU) 400mg/m<sup>2</sup> ※急速静注【約5分程度】</p> <p>③ フルオロウラシル注(5-FU) 2400mg/m<sup>2</sup>【46時間持続投与】</p> <p>↓</p> <p>2週間毎実施</p> <p>※ ③は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。</p>  |     |
| C18-12  | 大腸癌 | 大腸癌 FOLFIRI+ベバシズマブ   | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ベバシズマブ注(アバステン) 5mg/kg【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>② レポホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>+イリノテカン注 150mg/m<sup>2</sup>【同時に120分】</p> <p>③ フルオロウラシル(5-FU) 400mg/m<sup>2</sup> ※急速静注【約5分程度】</p> <p>④ フルオロウラシル(5-FU) 2400mg/m<sup>2</sup>【46時間持続投与】</p> <p>↓</p> <p>2週間毎実施</p> <p>※ ④は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。</p> |     |

| レジメンコード          | 分類  | レジメン名称             | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|------------------|-----|--------------------|--|-----|
| C18-13<br>C18-14 | 大腸癌 | 大腸癌 FOLFIRI+セツキシマブ | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① セツキシマブ注(アービタックス)<br/>                     ※初回と2回目以降は投与量・時間が変更になります<br/>                     初回 400mg/m<sup>2</sup> 2回目以降 250mg/m<sup>2</sup>【初回120分、2回目以降60分】</p> <p>② レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>+イリノテカン注 150mg/m<sup>2</sup> 【同時に120分】<br/>                     ③ フルオロウラシル(5-FU) 400mg/m<sup>2</sup> ※急速静注【約5分程度】<br/>                     ④ フルオロウラシル(5-FU) 2400mg/m<sup>2</sup> 【46時間持続投与】</p> <p>↓<br/>                     2週間毎実施</p> |     |
| C18-15           | 大腸癌 | 大腸癌 FOLFIRI+パニツムマブ | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① パニツムマブ注(ベクティビックス) 6mg/kg 【60分】<br/>                     ② レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>+イリノテカン注 150mg/m<sup>2</sup> 【同時に120分】<br/>                     ③ フルオロウラシル注(5-FU) 400mg/m<sup>2</sup> ※急速静注【約5分程度】<br/>                     ④ フルオロウラシル注(5-FU) 2400mg/m<sup>2</sup> 【46時間持続投与】</p> <p>↓<br/>                     2週間毎実施</p> <p>※ ④は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。</p>  |     |
| C18-17           | 大腸癌 | 大腸癌 FOLFIRI+ラムシルマブ | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ラムシルマブ注(サイラムザ) 8mg/kg【60分】<br/>                     ② 生理食塩液 【初回60分、2～4回目15分、5回目以降 約5分】<br/>                     ③ レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>+イリノテカン注 150mg/m<sup>2</sup> 【同時に120分】<br/>                     ④ フルオロウラシル注(5-FU) 400mg/m<sup>2</sup> ※急速静注【約5分程度】<br/>                     ⑤ フルオロウラシル注(5-FU) 2400mg/m<sup>2</sup> 【46時間持続投与】</p> <p>↓<br/>                     2週間毎実施</p> <p>※ ⑤は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。</p>              |     |

| レジメンコード | 分類  | レジメン名称                     | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄   |
|---------|-----|----------------------------|--|---|
| C18-18  | 大腸癌 | 大腸癌 FOLFIRI+アフリベルセプト       | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① アフリベルセプト注(ザルトラップ) 4mg/kg【60分】</p> <p>② レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>+イリノテカン注 150mg/m<sup>2</sup>【同時に120分】</p> <p>③ フルオロウラシル注(5-FU) 400mg/m<sup>2</sup> ※急速静注【約5分程度】</p> <p>④ フルオロウラシル注(5-FU) 2400mg/m<sup>2</sup>【46時間持続投与】</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>2週間毎実施</p> <p>※ ④は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。</p> |   |
| C18-23  | 大腸癌 | 大腸癌 オキサリプラチン+カペシタビン        | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① オキサリプラチン注 130mg/m<sup>2</sup>【120分 点滴静注】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)</p> <p>② カペシタピン錠(ゼローダ錠) 1000mg/m<sup>2</sup>/回<br/>【1日2回 14日間内服し、7日間休薬】</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>  | <p>&lt;カペシタピン(ゼローダ錠)投与量&gt;</p> <p>体表面積</p> <p>1.36m<sup>2</sup>未満(1200mg/回) × 2</p> <p>1.36-1.66m<sup>2</sup>未満(1500mg/回) × 2</p> <p>1.66-1.96m<sup>2</sup>未満(1800mg/回) × 2</p> <p>1.96m<sup>2</sup>以上(2100mg/回) × 2</p> |
| C18-24  | 大腸癌 | 大腸癌 オキサリプラチン+カペシタビン+ベバシズマブ | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ベバシズマブ注(アバスチン) 7.5mg/kg【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>② オキサリプラチン注 130mg/m<sup>2</sup>【120分 点滴静注】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)</p> <p>③ カペシタピン錠(ゼローダ錠) 1000mg/m<sup>2</sup>/回<br/>【1日2回 14日間内服し、7日間休薬】</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>   | <p>&lt;カペシタピン(ゼローダ錠)投与量&gt;</p> <p>体表面積</p> <p>1.36m<sup>2</sup>未満(1200mg/回) × 2</p> <p>1.36-1.66m<sup>2</sup>未満(1500mg/回) × 2</p> <p>1.66-1.96m<sup>2</sup>未満(1800mg/回) × 2</p> <p>1.96m<sup>2</sup>以上(2100mg/回) × 2</p> |

| レジメンコード | 分類  | レジメン名称                  | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄   |
|---------|-----|-------------------------|---|---|
| C18-25  | 大腸癌 | 大腸癌 カペシタビン+ベバシズマブ       | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① ベバシズマブ注(アバステン)<br/>7.5mg/kg【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)<br/>③ カペシタピン錠(ゼローダ錠) 1000mg/m<sup>2</sup>/回<br/>【1日2回 14日間内服し、7日間休薬】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>  | <p>&lt;カペシタビン(ゼローダ錠)投与量&gt;</p> <p>体表面積<br/>1.36㎡未満(1200mg/回) × 2<br/>1.36-1.66㎡未満(1500mg/回) × 2<br/>1.66-1.96㎡未満(1800mg/回) × 2<br/>1.96㎡以上(2100mg/回) × 2</p> |
| C18-35  | 大腸癌 | 大腸癌 オキサリプラチン+S-1        | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① オキサリプラチン注 130mg/m<sup>2</sup>【120分 点滴静注】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)<br/>② S-1(ティーエスワン または エスワンタイホウ)<br/>40～60mg/回【1日2回 14日間内服し、7日間休薬】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>  | <p>&lt;S-1の投与量&gt;</p> <p>体表面積&lt;1.25: 40mg/回 × 2<br/>1.25≤体表面積&lt;1.5: 50mg/回 × 2<br/>1.5≤体表面積: 60mg/回 × 2</p>  |
| C18-36  | 大腸癌 | 大腸癌 オキサリプラチン+S-1+ベバシズマブ | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① ベバシズマブ注(アバステン)<br/>7.5mg/kg【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>② オキサリプラチン注 130mg/m<sup>2</sup>【120分 点滴静注】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)<br/>③ S-1(ティーエスワン または エスワンタイホウ)<br/>40～60mg/回【1日2回 14日間内服し、7日間休薬】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p> | <p>&lt;S-1の投与量&gt;</p> <p>体表面積&lt;1.25: 40mg/回 × 2<br/>1.25≤体表面積&lt;1.5: 50mg/回 × 2<br/>1.5≤体表面積: 60mg/回 × 2</p>  |

| レジメンコード | 分類  | レジメン名称            | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄  |
|---------|-----|-------------------|--|--|
| C18-37  | 大腸癌 | 大腸癌 S-1+ペバシズマブ    | <p>【1クール 42日間】</p> <p>1・15・29日目</p> <p>① ペバシズマブ注(アバステン)<br/>5mg/kg【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>1～28日目 (1日目の夕食後から29日目の朝食後まで)</p> <p>③ S-1(ティーエスワン または エスワンタイホウ)<br/>40～60mg/回【1日2回 28日間内服し、14日間休薬】</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>22日目から同様に実施</p> | <p>&lt;S-1の投与量&gt;</p> <p>体表面積&lt;1.25: 40mg/回 × 2<br/>1.25≤体表面積&lt;1.5: 50mg/回 × 2<br/>1.5≤体表面積: 60mg/回 × 2</p>   |
| C18-39  | 大腸癌 | 大腸癌 ロンサーフ+ペバシズマブ  | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペバシズマブ注(アバステン)<br/>5mg/kg【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>1～5日目、8～12日目</p> <p>② トリフルリジン/チピラシル(ロンサーフ) 35mg/m<sup>2</sup>/日</p>  | <p>&lt;トリフルリジン/チピラシルの投与量&gt;</p> <p>1.07以上～1.23未満 40mg/回 × 2<br/>1.23以上～1.38未満 45mg/回 × 2<br/>1.38以上～1.53未満 50mg/回 × 2<br/>1.53以上～1.69未満 55mg/回 × 2<br/>1.69以上～1.84未満 60mg/回 × 2<br/>1.84以上～1.99未満 65mg/回 × 2<br/>1.99以上～2.15未満 70mg/回 × 2<br/>2.15以上 75mg/回 × 2</p> |
| C18-40  | 大腸癌 | 大腸癌 4週毎イリノテカン+S-1 | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・15日目</p> <p>① イリノテカン注 125mg/m<sup>2</sup>【90分 点滴静注】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)</p> <p>② S-1(ティーエスワン または エスワンタイホウ)<br/>40～60mg/回【1日2回 14日間内服し、14日間休薬】</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>29日目から同様に実施</p>                  | <p>&lt;S-1の投与量&gt;</p> <p>体表面積&lt;1.25: 40mg/回 × 2<br/>1.25≤体表面積&lt;1.5: 50mg/回 × 2<br/>1.5≤体表面積: 60mg/回 × 2</p>   |

| レジメンコード | 分類  | レジメン名称                   | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄   |
|---------|-----|--------------------------|--|---|
| C18-41  | 大腸癌 | 大腸癌 4週毎イリノテカン+S-1+ペバシズマブ | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・15日目</p> <p>① ペバシズマブ注(アバステン) 5mg/kg【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>② イリノテカン注 125mg/m<sup>2</sup>【90分 点滴静注】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)</p> <p>③ S-1(ティーエスワン または エスワンタイホウ) 40～60mg/回【1日2回 14日間内服し、14日間休薬】</p> <p>↓</p> <p>29日目から同様に実施</p> | <p>&lt;S-1の投与量&gt;</p> <p>体表面積&lt;1.25: 40mg/回 ×2</p> <p>1.25≤体表面積&lt;1.5: 50mg/回 ×2</p> <p>1.5≤体表面積: 60mg/回 ×2</p> |
| C18-42  | 大腸癌 | 大腸癌 4週毎イリノテカン+S-1+パニツムマブ | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・15日目</p> <p>① パニツムマブ注(ベクティビックス) 6mg/kg【60分】</p> <p>② イリノテカン注 125mg/m<sup>2</sup>【90分 点滴静注】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)</p> <p>③ S-1(ティーエスワン または エスワンタイホウ) 40～60mg/回【1日2回 14日間内服し、14日間休薬】</p> <p>↓</p> <p>29日目から同様に実施</p>                   | <p>&lt;S-1の投与量&gt;</p> <p>体表面積&lt;1.25: 40mg/回 ×2</p> <p>1.25≤体表面積&lt;1.5: 50mg/回 ×2</p> <p>1.5≤体表面積: 60mg/回 ×2</p> |
| C18-43  | 大腸癌 | 大腸癌 3週毎イリノテカン+S-1        | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① イリノテカン注 150mg/m<sup>2</sup>【90分 点滴静注】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)</p> <p>② S-1(ティーエスワン または エスワンタイホウ) 40～60mg/回【1日2回 14日間内服し、7日間休薬】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>  | <p>&lt;S-1の投与量&gt;</p> <p>体表面積&lt;1.25: 40mg/回 ×2</p> <p>1.25≤体表面積&lt;1.5: 50mg/回 ×2</p> <p>1.5≤体表面積: 60mg/回 ×2</p> |
| C18-44  | 大腸癌 | 大腸癌 3週毎イリノテカン+S-1+ペバシズマブ | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペバシズマブ注(アバステン) 7.5mg/kg 【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>② イリノテカン注 150mg/m<sup>2</sup>【90分 点滴静注】</p>   | <p>&lt;S-1の投与量&gt;</p> <p>体表面積&lt;1.25: 40mg/回 ×2</p> <p>1.25≤体表面積&lt;1.5: 50mg/回 ×2</p> <p>1.5≤体表面積: 60mg/回 ×2</p> |

| レジメンコード          | 分類  | レジメン名称                       | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄 |
|------------------|-----|------------------------------|---|-----|
|                  |     |                              | 1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)<br>③ S-1 (ティーエスワン または エスワンタイホウ)<br>40～60mg/回【1日2回 14日間内服し、7日間休薬】<br>↓<br>22日目から同様に実施   |     |
| C18-45<br>C18-46 | 大腸癌 | 大腸癌 セツキシマブ単独                 | 【1クール 35日間】<br>1・8・15・22・29日目<br>① セツキシマブ注(アービタックス)<br>※初回と2回目以降は投与量・時間が違います。<br>初回 400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降 250mg/m <sup>2</sup> 【初回2時間 2回目以降1時間】<br>※静脈点滴にて実施します。   |     |
| C18-47<br>C18-48 | 大腸癌 | 大腸癌 毎週セツキシマブ+エンコラフェニブ+ビニメチニブ | 【1クール 7日間】<br>1日目<br>① セツキシマブ注(アービタックス)<br>※初回と2回目以降は投与量・時間が違います。<br>初回 400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降 250mg/m <sup>2</sup> 【初回2時間 2回目以降1時間】<br>1日目～ 毎日内服<br>②エンコラフェニブ(ピラフトビ カプセル) 1日1回 1回450mg【内服】<br>③ビニメチニブ(メクトビ錠) 1日2回 1回 45mg【内服】<br>※ 副作用により服用量を減らすことがあります。 |     |
| C18-49           | 大腸癌 | 大腸癌 イリノテカン+パニツムマブ            | 【1クール 14日間】<br>1日目<br>① パニツムマブ注(ベクティビックス) 6mg/kg【60分】 点滴静注<br>① イリノテカン注 150mg/m <sup>2</sup> 【90分】 点滴静注<br>↓<br>15日目から同様に実施   |     |

| レジメンコード | 分類  | レジメン名称               | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄 |
|---------|-----|----------------------|---|-----|
| C18-50  | 大腸癌 | 大腸癌 パニツムマブ単独         | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① パニツムマブ注(ベクティビックス) 6mg/kg【60分 点滴静注】<br/>↓<br/>2週間毎実施</p>   |     |
| C18-52  | 大腸癌 | 大腸癌 FOLFOXIRI        | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① イリノテカン注 165mg/m<sup>2</sup>【90分】<br/>② レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>+オキサリプラチン注 85mg/m<sup>2</sup>【同時に120分】<br/>③ フルオロウラシル注 3200mg/m<sup>2</sup>【46時間】</p>  |     |
| C18-53  | 大腸癌 | 大腸癌 FOLFOXIRI+ベバシズマブ | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① ベバシズマブ注(アバステン) 5mg/kg<br/>【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】<br/>② イリノテカン注 165mg/m<sup>2</sup>【90分】<br/>③ レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>+オキサリプラチン注 85mg/m<sup>2</sup>【同時に120分】<br/>④ フルオロウラシル注 3200mg/m<sup>2</sup>【46時間】</p> |     |
| C18-54  | 大腸癌 | 大腸癌 m-FOLFOXIRI      | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① イリノテカン注 150mg/m<sup>2</sup>【90分】<br/>② レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>+オキサリプラチン注 85mg/m<sup>2</sup>【同時に120分】<br/>③ フルオロウラシル注 2400mg/m<sup>2</sup>【46時間】</p> <p>※ ③は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。</p>                      |     |



| レジメコード | 分類  | レジメ名称                    | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄  |
|--------|-----|--------------------------|---|--|
| C18-55 | 大腸癌 | 大腸癌 m-FOLFOXIRI+ペバシズマブ   | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペバシズマブ注(アバステン) 5mg/kg<br/>【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>② イリノテカン注 150mg/m<sup>2</sup>【90分】</p> <p>③ レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>+オキサリプラチン注 85mg/m<sup>2</sup>【同時に120分】</p> <p>④ フルオロウラシル注 2400mg/m<sup>2</sup>【46時間】</p> <p>※ ④は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。</p>         |  |
| C18-56 | 大腸癌 | 大腸癌 イリノテカン+カペシタビン        | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① イリノテカン注 200mg/m<sup>2</sup>【90分 点滴静注】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)</p> <p>② カペシタビン(ゼローダ錠)<br/>800mg/m<sup>2</sup>/回【1日2回 14日間内服し、7日間休薬】</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>   | <p>&lt;カペシタビン(ゼローダ錠)投与量&gt;</p> <p>体表面積</p> <p>1.36㎡未満(900mg/回) × 2</p> <p>1.36-1.66㎡未満(1200mg/回) × 2</p> <p>1.66-1.96㎡未満(1500mg/回) × 2</p> <p>1.96㎡以上(1800mg/回) × 2</p> |
| C18-57 | 大腸癌 | 大腸癌 イリノテカン+カペシタビン+ペバシズマブ | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペバシズマブ注(アバステン) 7.5mg/kg<br/>【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>② イリノテカン注 200mg/m<sup>2</sup>【90分 点滴静注】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)</p> <p>③ カペシタビン(ゼローダ錠)<br/>800mg/m<sup>2</sup>/回【1日2回 14日間内服し、7日間休薬】</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>22日目から同様に実施</p> | <p>&lt;カペシタビン(ゼローダ錠)投与量&gt;</p> <p>体表面積</p> <p>1.36㎡未満(900mg/回) × 2</p> <p>1.36-1.66㎡未満(1200mg/回) × 2</p> <p>1.66-1.96㎡未満(1500mg/回) × 2</p> <p>1.96㎡以上(1800mg/回) × 2</p> |
| C18-80 | 大腸癌 | 大腸癌 ニボルマブ+イピリムマブ         | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ニボルマブ(オプジーボ)注 240mg【30分】</p> <p>② イピリムマブ(ヤーボイ)注 1mg/kg【30分】</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>22日目から同様に実施</p> <p>※ イピリムマブ注は4回を上限として投与します。</p> <p>※ ①と②の間は30分間 経過観察をします。</p>  | <p>【免疫チェックポイント阻害薬】</p> <p>ニボルマブ、イピリムマブ</p>   |

| レジメンコード | 分類   | レジメン名称              | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄                        |
|---------|------|---------------------|---|----------------------------|
| C18-81  | 大腸癌  | 大腸癌 ニボルマブ(2週毎)      | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① ニボルマブ(オプジーボ)注 240mg【30分】</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>15日目から同様に実施</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ   |
| C18-82  | 大腸癌  | 大腸癌 ニボルマブ(4週毎)      | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>① ニボルマブ(オプジーボ)注 480mg【30分】</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>29日目から同様に実施</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ   |
| C22-10  | 肝細胞癌 | 肝細胞癌 ラムシルマブ         | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① ラムシルマブ(サイラムザ注) 8mg/kg【60分】<br/>(ラムシルマブ初回および2回目の投与は終了後に60分間経過観察をします)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>2週間後、同様に実施</p>  |                            |
| C22-30  | 肝細胞癌 | 肝細胞癌 アテゾリズマブ+ベバシズマブ | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① アテゾリズマブ注(テセントリク)1200mg【初回60分、以降30分】<br/>② ベバシズマブ注(アバステン) 15mg/kg【初回90分、2回目60分、以降30分】</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>22日目から同様に実施</p> <p>※ アテゾリズマブ注の副作用で治療が継続できなくなった場合、ベバシズマブ注のみになります。</p> | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>アテゾリズマブ |
| C22-31  | 肝細胞癌 | 肝細胞癌 ベバシズマブ         | <p>【1クール 21日間】</p> <p>① アバステン(ベバシズマブ)注 15mg/kg 【点滴静注】【30分】</p> <p>※テセントリクの副作用により併用できなくなった場合に使用します。</p>  |                            |

| レジメンコード          | 分類   | レジメン名称                    | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄                                |
|------------------|------|---------------------------|---|------------------------------------|
| C22-50<br>C22-51 | 肝細胞癌 | 肝細胞癌 デュルバルマブ+トレメリムマブ      | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目</p> <p>① イミフィンジ注(デュルバルマブ)<br/>30kg超 1500mg【1時間】<br/>30kg以下 20mg/kg【1時間】</p> <p>② イジユド注(トレメリムマブ)<br/>30kg超 300mg【1時間】<br/>30kg以下 4mg/kg【1時間】</p> <p>↓</p> <p>次回から①のみで継続</p>                            | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>デュルバルマブ、トレメリムマブ |
| C22-52<br>C22-53 | 肝細胞癌 | 肝細胞癌 デュルバルマブ単独            | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目</p> <p>① イミフィンジ注(デュルバルマブ)<br/>30kg超 1500mg【1時間】<br/>30kg以下 20mg/kg【1時間】</p> <p>↓</p> <p>29日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>デュルバルマブ         |
| C24-01           | 胆道癌  | 胆道癌 GC(ゲムシタピン+シスプラチン)     | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1・8日目</p> <p>① シスプラチン注 25mg/m<sup>2</sup>【60分 点滴静注】<br/>② ゲムシタピン注 1000mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p> <p>※ 腎障害予防のため、抗がん剤投与の前後に十分な水分を点滴します。</p>   |                                    |
| C24-03           | 胆道癌  | 胆道癌 デュルバルマブ+シスプラチン+ゲムシタピン | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① デュルバルマブ(イミフィンジ)注 1500mg【60分 点滴静注】</p> <p>1・8日目</p> <p>① シスプラチン注 25mg/m<sup>2</sup>【60分 点滴静注】<br/>② ゲムシタピン注 1000mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p> <p>※ 腎障害予防のため、抗がん剤(シスプラチン)投与中に水分摂取をお願いします。</p> | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>デュルバルマブ         |

| レジメンコード | 分類  | レジメン名称                       | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄   |
|---------|-----|------------------------------|--|---|
| C24-04  | 胆道癌 | 胆道癌 デュルバルマブ(4週毎)             | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>① デュルバルマブ(イミフィンジ)注 1500mg【60分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>   | <p>【免疫チェックポイント阻害薬】<br/>デュルバルマブ</p>  |
| C24-05  | 胆道癌 | 胆道癌 GCS(ゲムシタビン+シスプラチン+S-1)   | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① シスプラチン注 25mg/m<sup>2</sup>【60分 点滴静注】<br/>② ゲムシタビン注 1000mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】<br/>※ 腎障害予防のため、抗がん剤投与の前後に十分な水分を点滴します。</p> <p>1～7日目 (1日目の夕食後から8日目の朝食後まで)<br/>③ TS-1(ティーエスワン または エスワンタイホウ)<br/>40～60mg/回 【1日2回 7日間内服し、7日間休薬】</p> <p>↓</p> <p>15日目から同様に実施</p> | <p>&lt;S-1の投与量&gt;</p> <p>体表面積&lt;1.25: 40mg/回 ×2<br/>1.25≦体表面積&lt;1.5: 50mg/回 ×2<br/>1.5≦体表面積: 60mg/回 ×2</p> |
| C24-50  | 胆道癌 | 胆道癌 mGEMOX (ゲムシタビン+オキサリプラチン) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1・8日目<br/>① オキサリプラチン注 80mg/m<sup>2</sup>【120分 点滴静注】<br/>② ゲムシタビン注 900mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p>  |   |
| C25-01  | 胆道癌 | 膵胆道癌 ゲムシタビン                  | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・8・15日目<br/>① ゲムシタビン注 1000mg/m<sup>2</sup>【30分】</p> <p>↓</p> <p>29日目から同様に実施</p>   |   |

| レジメンコード | 分類  | レジメン名称              | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄   |
|---------|-----|---------------------|--|---|
| C25-02  | 胆道癌 | 膵胆道癌 GS(ゲムシタピン+S-1) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1・8日目<br/>① ゲムシタピン注 1000mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p> <p>1～14日目 (1日目の夕食後から15日目の朝食後まで)<br/>② TS-1(ティーエスワン または エスワンタイホウ)<br/>40～60mg/回 【1日2回 14日間内服し、7日間休薬】<br/>↓<br/>22日目から同様に実施</p> <p>※ 病状や副作用の発現状況により、投与スケジュールや投与量に変更される場合があります。</p>                                    | <p>&lt;S-1の投与量&gt;</p> <p>体表面積&lt;1.25: 40mg/回 ×2<br/>1.25≤体表面積&lt;1.5: 50mg/回 ×2<br/>1.5≤体表面積: 60mg/回 ×2</p> |
| C25-10  | 膵臓癌 | 膵臓癌 アブラキサン+ゲムシタピン   | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・8・15日目<br/>① アブラキサン注 125mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】<br/>② ゲムシタピン注 1000mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】<br/>↓<br/>29日目から同様に実施</p>  |   |
| C25-11  | 膵臓癌 | 膵臓癌 ゲムシタピン+エルロチニブ   | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・8・15日目<br/>① ゲムシタピン注 1000mg/m<sup>2</sup>【30分】</p> <p>1～28日目<br/>② エルロチニブ(タルセバ錠)100mg/回 【1日1回 食事を避けて 連日服用】<br/>↓<br/>29日目から同様に実施</p>   |   |
| C25-13  | 膵臓癌 | 膵臓癌 FOLFIRINOX      | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① オキサリプラチン注 85mg/m<sup>2</sup>【120分】<br/>② レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>+イリノテカン注 180mg/m<sup>2</sup>【同時に120分】<br/>③ フルオロウラシル注(5-FU) 400mg/m<sup>2</sup> ※急速静注【約5分程度】<br/>④ フルオロウラシル注(5-FU) 2400mg/m<sup>2</sup>【46時間持続投与】</p> <p>※ ④は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。</p> |   |

| レジメンコード | 分類     | レジメン名称                         | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄 |
|---------|--------|--------------------------------|---|-----|
| C25-14  | 膵臓癌    | 膵臓癌 m-FOLFIRINOX               | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① オキサリプラチン注 85mg/m<sup>2</sup>【120分】</p> <p>② イリノテカン注 150mg/m<sup>2</sup>+ レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>【同時に120分】</p> <p>③ フルオロウラシル注(5-FU) 2400mg/m<sup>2</sup>【46時間持続投与】</p> <p>※ ③は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。</p>         |     |
| C25-17  | 膵臓癌    | 膵臓癌 オニバイド+フルオロウラシル (CVポート)     | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① オニバイド注(リポソーム化イリノテカン) 70mg/m<sup>2</sup>【90分】</p> <p>② レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>【120分】</p> <p>③ フルオロウラシル注(5-FU) 2400mg/m<sup>2</sup>【46時間持続投与】</p> <p>※ ③は医薬品注入用ポンプを使ってCVポートより投与します。</p>                               |     |
| C25-18  | 膵臓癌    | 膵臓癌 オニバイド+フルオロウラシル (DIV)       | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① オニバイド注(リポソーム化イリノテカン) 70mg/m<sup>2</sup>【90分】</p> <p>② レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup>【120分】</p> <p>③ フルオロウラシル注(5-FU) 1200mg/m<sup>2</sup>【23時間 点滴静注】</p> <p>2日目</p> <p>④フルオロウラシル注(5-FU) 1200mg/m<sup>2</sup>【23時間 点滴静注】</p> |     |
| C34-14  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 ハクリタキセル+カルボプラチン (放射線併用) | <p>【1クール 7日間】</p> <p>1日目</p> <p>① パクリタキセル注 40mg/m<sup>2</sup>【1時間 点滴静注】</p> <p>② カルボプラチン注 AUC2【1時間 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>8日目以降同様に実施</p>   |     |
| C34-15  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 ハクリタキセル+カルボプラチン (一括投与)  | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① パクリタキセル注 200mg/m<sup>2</sup>【3時間 点滴静注】</p> <p>② カルボプラチン注 AUC5【1時間 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p>  |     |

| レジメンコード | 分類     | レジメン名称                       | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄                      |
|---------|--------|------------------------------|---|--------------------------|
| C34-16  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 ニボルマブ+パクリタキセル+カルボプラチン | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ニボルマブ注(オプジーボ) 360mg【30分】</p> <p>② 生理食塩液【30分】</p> <p>③ パクリタキセル注 200mg/m<sup>2</sup>【3時間】</p> <p>④ カルボプラチン注 AUC5【60分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p> <p>※ 吐気止めの点滴もあります</p>      | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ |
| C34-23  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 ニボルマブ+ペトレキセド+カルボプラチン  | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ニボルマブ注(オプジーボ) 360mg【30分】</p> <p>② 生理食塩液【30分】</p> <p>③ ペトレキセド注(アリムタ) 500mg/m<sup>2</sup>【10分】</p> <p>④ カルボプラチン注 AUC5【60分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p> <p>※ 吐気止めの点滴もあります</p> | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ |
| C34-24  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 カルボプラチン+ペトレキセド+ペバシズマブ | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペトレキセド(アリムタ)注 500mg/m<sup>2</sup>【10分】</p> <p>② カルボプラチン注 AUC5【60分】</p> <p>③ ペバシズマブ注(アバステン) 15mg/kg<br/>【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>              |                          |
| C34-25  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 ペトレキセド+ペバシズマブ         | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペトレキセド(アリムタ)注 500mg/m<sup>2</sup>【10分】</p> <p>② ペバシズマブ注(アバステン) 15mg/kg<br/>【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>  |                          |

| レジメンコード | 分類     | レジメン名称                   | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄 |
|---------|--------|--------------------------|---|-----|
| C34-34  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 シスプラチン + ビノレルビン   | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ①ビノレルビン(ロゼウス)注 25mg/m<sup>2</sup>【5分】<br/>                     ②シスプラチン注 80mg/m<sup>2</sup>【60分】<br/>                     ※ 加えて吐気止め及び腎障害予防のための点滴があります。</p> <p>8日目<br/>                     ①ビノレルビン(ロゼウス)注 25mg/m<sup>2</sup>【5分】<br/>                     ↓<br/>                     22日目から同様に実施</p>                                  |     |
| C34-35  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 シスプラチン分割 + ビノレルビン | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ①ビノレルビン(ロゼウス)注 25mg/m<sup>2</sup>【5分】<br/>                     ②シスプラチン注 40mg/m<sup>2</sup>【60分】</p> <p>8日目<br/>                     ①ビノレルビン(ロゼウス)注 25mg/m<sup>2</sup>【5分】<br/>                     ②シスプラチン注 40mg/m<sup>2</sup>【60分】<br/>                     ↓<br/>                     22日目から同様に実施 ※ 加えて吐気止め及び腎障害予防のための点滴があります。</p> |     |
| C34-38  | 小細胞肺癌  | 小細胞肺癌 シスプラチン + イリノテカン    | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>                     ①イリノテカン注 60mg/m<sup>2</sup>【90分】<br/>                     ②シスプラチン注 60mg/m<sup>2</sup>【60分】<br/>                     ※ 抗がん剤投与に加えて腎障害予防のための点滴があります。</p> <p>8・15日目<br/>                     ①イリノテカン注 60mg/m<sup>2</sup>【90分】<br/>                     ↓<br/>                     29日目から同様に実施</p>  |     |



| レジメンコード | 分類     | レジメン名称                                | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄                        |
|---------|--------|---------------------------------------|--|----------------------------|
| C34-39  | 小細胞肺癌  | 小細胞肺癌 シスプラチン+エトポシド                    | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ①エトポシド注 100mg/m<sup>2</sup>【120分】<br/>                     ②シスプラチン注 80mg/m<sup>2</sup>【60分】<br/>                     ※ 抗がん剤投与に伴い、加えて吐気止め及び腎障害予防のための点滴があります。</p> <p>2・3日目<br/>                     ①エトポシド注 100mg/m<sup>2</sup>【120分】<br/>                     ↓<br/>                     22日目から同様に実施</p> |                            |
| C34-40  | 小細胞肺癌  | 小細胞肺癌 カルボプラチン+エトポシド                   | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ①エトポシド注 80mg/m<sup>2</sup>【120分】<br/>                     ②カルボプラチン注 AUC5【60分】</p> <p>2・3日目<br/>                     ①エトポシド注 80mg/m<sup>2</sup>【120分】<br/>                     ↓<br/>                     22日目から同様に実施</p>  |                            |
| C34-41  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 アテゾリズマブ+ヘパンスマブ+パクリタキセル+カルボプラチン | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① アテゾリズマブ注(テセントリク)【初回60分】【以降30分】<br/>                     ② ペバシズマブ注(アバステン)【初回90分】【2回目60分】【以降30分】<br/>                     ③ パクリタキセル注【3時間】<br/>                     ④ カルボプラチン注【60分】<br/>                     ↓<br/>                     22日目から同様に実施<br/>                     ※ 吐気止めの点滴もあります</p>          | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>アテゾリズマブ |
| C34-42  | 小細胞肺癌  | 小細胞肺癌 アテゾリズマブ                         | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① アテゾリズマブ注(テセントリク)<br/>                     1200mg【初回:1時間、2回目以降は30分】<br/>                     ↓<br/>                     22日目から同様に実施</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>アテゾリズマブ |

| レジメンコード | 分類     | レジメン名称                           | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄                        |
|---------|--------|----------------------------------|---|----------------------------|
| C34-47  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 ベバシズマブ + エルロチニブ           | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>①ベバシズマブ注(アバステン)<br/>15mg/kg【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>1～21日目 (1日1回 連日内服)<br/>② エルロチニブ(タルセバ)錠<br/>150mg/回【1日1回 食事の1時間以上前又は食後2時間以降】</p> <p>↓</p> <p>22日目から次クールへ同様に繰り返し</p> |                            |
| C34-50  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 カルボプラチン + アブラキサン          | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>①アブラキサン注 100mg/m<sup>2</sup>【30分】<br/>②カルボプラチン注 AUC6【60分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>   |                            |
| C34-57  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 ドセタキセル+ラムシルマブ             | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>①ラムシルマブ注(サイラムザ) 10mg/kg【60分】<br/>②ドセタキセル注 60mg/m<sup>2</sup>【60分】</p> <p>※ ラムシルマブ投与後、経過観察のため、生理食塩液の投与があります。</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>                                     |                            |
| C34-58  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 デュルバルマブ(4週毎)<br>※ 体重30kg超 | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>①デュルバルマブ(イミフィンジ)注 1500mg【60分】</p> <p>↓</p> <p>29日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>デュルバルマブ |

| レジメンコード | 分類     | レジメン名称                            | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄                         |
|---------|--------|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| C34-59  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 デュルバルマブ(4週毎)<br>※ 体重30kg以下 | 【1クール 28日間】<br>1日目<br>① デュルバルマブ(イミフィンジ)注 20mg/kg【60分】<br>↓<br>29日目から同様に実施             | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>デュルバルマブ  |
| C34-60  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 ニボルマブ(2週毎)                 | 【1クール 14日間】<br>1日目<br>① ニボルマブ(オプジーボ)注 240mg【30分】<br>↓<br>15日目から同様に実施                  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ    |
| C34-61  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 ペムブロリズマブ(3週毎)              | 【1クール 21日間】<br>1日目<br>① ペムブロリズマブ(キイトルーダ)注 200mg【30分】<br>↓<br>22日目から同様に実施              | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C34-62  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 アテゾリズマブ(3週毎)               | 【1クール 21日間】<br>1日目<br>① アテゾリズマブ注(テセントリク) 1200mg【初回:1時間、2回目以降は30分】<br>↓<br>22日目から同様に実施 | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>アテゾリズマブ  |
| C34-64  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 ニボルマブ(4週毎)                 | 【1クール 28日間】<br>1日目<br>① ニボルマブ(オプジーボ)注 480mg【30分】<br>↓<br>29日目から同様に実施                  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ    |

| レジメンコード | 分類     | レジメン名称               | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄                                    |
|---------|--------|----------------------|---|--|
| C34-65  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 ペムブロリズマブ(6週毎) | <p>【1クール 42日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペムブロリズマブ(キイトルーダ)注 400mg【30分】</p> <p>↓</p> <p>43日目から同様に実施</p> | <p>【免疫チェックポイント阻害薬】</p> <p>ペムブロリズマブ</p> |

| レジメンコード | 分類     | レジメン名称                                 | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄                             |
|---------|--------|--|---|---------------------------------|
| C34-66  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 ニボルマブ+イピリムマブ                    | <p>【1クール 42日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ニボルマブ(オプジーボ)注 360mg【30分】<br/>                     ② イピリムマブ(ヤーポイ)注 1mg/kg【30分】</p> <p>22日目<br/>                     ① ニボルマブ(オプジーボ)注 360mg【30分】</p> <p>※ ①を投与後、30分間 経過観察をします。</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ、イピリムマブ |
| C34-67  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌<br>ニボルマブ+イピリムマブ+シスプラチン+ペメトレキセド  | <p>【1クール 42日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ニボルマブ(オプジーボ)注 360mg【30分】<br/>                     ② イピリムマブ(ヤーポイ)注 1mg/kg【30分】<br/>                     ③ ペメトレキセド注(アリムタ) 500mg/m<sup>2</sup>【10分】<br/>                     ④ シスプラチン注 75mg/m<sup>2</sup>【2時間】</p> <p>22日目<br/>                     ①、③、④を投与します。<br/>                     ※ ①を投与後、30分間 経過観察をします。<br/>                     ※ 薬剤による有害事象を予防するため、他薬剤の投与や十分量の点滴を行う必要があります。</p> | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ、イピリムマブ |
| C34-68  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌<br>ニボルマブ+イピリムマブ+カルボプラチン+ペメトレキセド | <p>【1クール 42日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ニボルマブ(オプジーボ)注 360mg【30分】<br/>                     ② イピリムマブ(ヤーポイ)注 1mg/kg【30分】<br/>                     ③ ペメトレキセド注(アリムタ) 500mg/m<sup>2</sup>【10分】<br/>                     ④ カルボプラチン注 AUC 6【2時間】</p> <p>22日目<br/>                     ①、③、④を投与します。</p> <p>※ ①を投与後、30分間 経過観察をします。<br/>                     ※ 薬剤による有害事象を予防するため、他薬剤の投与を行う必要があります。</p>                                      | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ、イピリムマブ |

| レジメンコード | 分類     | レジメン名称                                 | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄                             |
|---------|--------|--|---|---------------------------------|
| C34-69  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌<br>ニボルマブ+イピリムマブ+カルボプラチン+パクリタキセル | <p>【1クール 42日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ニボルマブ(オブジーボ)注 360mg【30分】<br/>                     ② イピリムマブ(ヤーボイ)注 1mg/kg【30分】<br/>                     ③ カルボプラチン注 AUC 5【1時間】<br/>                     ④ パクリタキセル注 210mg/m<sup>2</sup>【3時間】</p> <p>22日目<br/>                     ①、③、④を投与します。</p> <p>※ ①を投与後、30分間 経過観察をします。<br/>                     ※ 薬剤にアルコールが含まれていますので通院で自動車運転は控えてください。</p> | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ、イピリムマブ |
| C34-71  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 ペムブロリズマブ+ペムトレキセド+カルボプラチン        | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ペムブロリズマブ注(キイトルーダ) 200mg【30分】<br/>                     ② ペムトレキセド注(アリムタ) 500mg/m<sup>2</sup>【10分】<br/>                     ③ カルボプラチン注 AUC5【60分】</p> <p>↓<br/>                     22日目から同様に実施<br/>                     ※ 吐気止めの点滴もあります</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ     |

| レジメンコード | 分類     | レジメン名称                          | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄                         |
|---------|--------|---------------------------------|--|-----------------------------|
| C34-72  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 ペムブロリズマブ+ペトレキセト          | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペムブロリズマブ注(キイトルーダ) 200mg【30分】</p> <p>② ペトレキセド注(アリムタ) 500mg/m<sup>2</sup>【10分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p> <p>※ 吐気止めの点滴もあります</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C34-73  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 ペムブロリズマブ+アブラキサン+カルボプラチン  | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペムブロリズマブ注(キイトルーダ) 200mg【30分】</p> <p>② アブラキサン注(アルブミン懸濁型パクリタキセル) 100mg/m<sup>2</sup>【30分】</p> <p>③ カルボプラチン注 AUC6【60分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p> <p>※ 吐気止めの点滴もあります</p> | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C34-74  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 ペムブロリズマブ+パクリタキセル+カルボプラチン | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペムブロリズマブ注(キイトルーダ) 200mg【30分】</p> <p>② パクリタキセル注 200mg/m<sup>2</sup>【3時間】</p> <p>③ カルボプラチン注 AUC6【60分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p> <p>※ 吐気止めの点滴もあります</p>                 | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C34-78  | 小細胞肺癌  | 小細胞肺癌 アテゾリズマブ+カルボプラチン+エトポシド     | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① アテゾリズマブ注(テセントリク) 【初回60分】【以降30分】</p> <p>② エトポシド注 【120分】</p> <p>③ カルボプラチン注 【60分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p> <p>※ 吐気止めの点滴もあります</p>                                      | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>アテゾリズマブ  |

| レジメンコード | 分類     | レジメン名称                                      | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄                        |
|---------|--------|---|---|----------------------------|
| C34-79  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 アテゾリズマブ+ヘパシマブ                        | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① アテゾリズマブ注(テセントリク)1200mg【30分】<br/>                     ② ペバシズマブ注(アバステン)15mg/kg【30分】<br/>                     ↓<br/>                     22日目から同様に実施</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>アテゾリズマブ |
| C34-80  | 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌 アテゾリズマブ+カルボプラチン+アブラキサン               | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① アテゾリズマブ注(テセントリク) 1200mg【初回60分】【以降30分】<br/>                     ② アブラキサン(nab-パクリタキセル)注 100mg/m<sup>2</sup>【30分】<br/>                     ③ カルボプラチン注 AUC6【60分】</p> <p>8日目・15日目<br/>                     ④ アブラキサン(nab-パクリタキセル)注 100mg/m<sup>2</sup>【30分】<br/>                     ↓<br/>                     22日目から同様に実施<br/>                     ※ 吐気止めの点滴もあります</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>アテゾリズマブ |
| C37-01  | 胸腺腫    | 胸腺腫 ADOC(ドキシソルビシン+シスプラチン+ビンクリスチン+シクロホスファミド) | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目 ※ 前後に十分量の補液および吐気止めを点滴します。(計:14時間)<br/>                     ① ドキシソルビシン注 40mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】<br/>                     ② シスプラチン注 50mg/m<sup>2</sup>【90分 点滴静注】</p> <p>2日目<br/>                     ・維持補液(吐気止め・利尿剤入り) (計:6時間 点滴静注)</p> <p>3日目<br/>                     ① ビンクリスチン注 0.6mg/m<sup>2</sup>【約5分 点滴静注】<br/>                     ・前後、維持補液(吐気止め・利尿剤入り) (計:6時間 点滴静注)</p> <p>4日目<br/>                     ① シクロホスファミド注 700mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】<br/>                     ・前後、維持補液(吐気止め入り) (計:7時間)</p> <p>5日目<br/>                     ・維持補液(吐気止め入り) (計:6時間)</p> |                            |
| C37-05  | 胸腺癌    | 胸腺癌 パクリタキセル+カルボプラチン                         | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① パクリタキセル注 200mg/m<sup>2</sup>【3時間 点滴静注】<br/>                     ② カルボプラチン注 AUC5【1時間 点滴静注】<br/>                     ↓<br/>                     22日目以降同様に実施</p>  |                            |



| レジメンコード | 分類    | レジメン名称                 | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄                             |
|---------|-------|------------------------|--|---------------------------------|
| C43-10  | 悪性黒色腫 | 悪性黒色腫 ニボルマブ(2週毎)       | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① ニボルマブ(オプジーボ)注 240mg/回 【30分】</p> <p>↓</p> <p>15日目から同様に実施</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ        |
| C43-11  | 悪性黒色腫 | 悪性黒色腫 ニボルマブ+イピリムマブ     | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① ニボルマブ(オプジーボ)注 80mg/回 【30分】<br/>② イピリムマブ(ヤーポイ)注 3mg/kg 【30分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施<br/>※ イピリムマブ注は4回を上限として投与します。<br/>※ ①と②の間は30分間 経過観察をします。</p>        | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ、イピリムマブ |
| C43-12  | 悪性黒色腫 | 悪性黒色腫 ニボルマブ(4週毎)       | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>① ニボルマブ(オプジーボ)注 480mg/回 【30分】</p> <p>↓</p> <p>29日目から同様に実施</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ        |
| C45-01  | 中皮腫   | 悪性胸膜中皮腫 シスプラチン+ペメトレキセド | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>①ペメトレキセド(アリムタ)注 500mg/m<sup>2</sup> 【10分】<br/>②シスプラチン注【120分】75mg/m<sup>2</sup></p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p> <p>※ 投与前後に十分な水分を点滴静注します。また、吐気止めのお薬を使用します。</p> |                                 |
| C45-10  | 中皮腫   | 悪性中皮腫 2週毎ニボルマブ         | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① ニボルマブ(オプジーボ)注 240mg【30分】</p> <p>↓</p> <p>15日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ        |

| レジメンコード          | 分類       | レジメン名称                           | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄                             |
|------------------|----------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| C45-11           | 中皮腫      | 悪性胸膜中皮腫 ニボルマブ+イピリムマブ             | <p>【1クール 42日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ニボルマブ(オプジーボ)注 360mg【30分】<br/>                     ② イピリムマブ(ヤーボイ)注 1mg/kg【30分】</p> <p>15日目、29日目<br/>                     ① ニボルマブ(オプジーボ)注 360mg【30分】</p> <p>※ ①を投与後、30分間 経過観察をします。</p> | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ、イピリムマブ |
| D46-01<br>D46-02 | 骨髄異形成症候群 | 骨髄異形成症候群 アザシチジン<br>(点滴7日間、点滴5日間) | <p>【1クール 28日間】</p> <p>[外来の場合]1・2・3・4・5・6・7 日目<br/>                     [入院の場合]1・2・3・4・5 日目<br/>                     ① グラニセトロン注(吐気止め)【15分】<br/>                     ② アザシチジン注(ビダーザ) 75mg/m<sup>2</sup> 【10分】</p>                           |                                 |
| D46-03           | 骨髄異形成症候群 | 骨髄異形成症候群 アザシチジン<br>(皮下注7日間)      | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・2・3・4・5・6・7 日目<br/>                     ① グラニセトロン注(吐気止め)【15分】<br/>                     ② アザシチジン注(ビダーザ) 75mg/m<sup>2</sup></p> <p>基本的にアザシチジンは皮下注射で投与します<br/>                     患者さんの状態に合わせて点滴で投与する場合があります</p>    |                                 |
| D46-04           | 骨髄異形成症候群 | 骨髄異形成症候群 アザシチジン<br>(皮下注5日間)      | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・2・3・4・5 日目<br/>                     ① グラニセトロン注(吐気止め)【15分】<br/>                     ② アザシチジン注(ビダーザ) 75mg/m<sup>2</sup></p> <p>基本的にアザシチジンは皮下注射で投与します<br/>                     患者さんの状態に合わせて点滴で投与する場合があります</p>        |                                 |
| C49-01           | 悪性軟部腫瘍   | 血管肉腫 毎週 パクリタキセル                  | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・8・15日目<br/>                     ① パクリタキセル注 80mg/m<sup>2</sup></p> <p>1週間ごとに3回点滴静注し、2週間休薬します。</p>  |                                 |

| レジメンコード          | 分類       | レジメン名称                    | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄 |
|------------------|----------|---------------------------|---|-----|
| C49-10           | 悪性軟部腫瘍   | 悪性軟部腫瘍 トラベクテジン            | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1～2日目</p> <p>①トラベクテジン注(コンデリス) 1.2mg/m<sup>2</sup> 【24時間 中心静脈注】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p>  |     |
| C49-11           | 悪性軟部腫瘍   | 軟部肉腫 ドキソルビシン2分割           | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1・2日目</p> <p>①ドキソルビシン注 30mg/m<sup>2</sup> 【15分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p>  |     |
| C49-15<br>C49-16 | 悪性軟部腫瘍   | 悪性軟部腫瘍 エリブリン              | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1・8日目</p> <p>①エリブリン(ハラヴェン)注 1.4mg/m<sup>2</sup> 【約5分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>  |     |
| C49-30           | 小児悪性固形腫瘍 | 小児悪性固形腫瘍 ノギテカン+シクロフォスファミド | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1・2・3・4・5日目</p> <p>①ノギテカン(ハイカムチン)注 0.75mg/m<sup>2</sup> 【30分 点滴静注】</p> <p>②シクロフォスファミド(エンドキサン)注 250mg/m<sup>2</sup> 【2時間 点滴静注】</p>   |     |
| C49-31           | 小児悪性固形腫瘍 | 小児悪性固形腫瘍 イフォスファミド+エトポシド   | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1・2・3・4・5日目</p> <p>①エトポシド注 100mg/m<sup>2</sup> 【2時間 点滴静注】</p> <p>②イフォスファミド(イホマイド)注 1800mg/m<sup>2</sup> 【4時間 点滴静注】</p> <p>※ 抗がん薬による副作用予防のための薬剤を別に投与するため、入院により5日間連続の点滴静注治療となります。</p> |     |

| レジメンコード          | 分類 | レジメン名称                    | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄 |
|------------------|----|---------------------------|---|-----|
| C50-01           | 乳癌 | 乳癌 FEC100                 | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① エピルビシン(ファルモルピシン) 100mg/m<sup>2</sup>【5分 点滴静注】</p> <p>② シクロスファミド(エンドキサン) 500mg/m<sup>2</sup>【60分 点滴静注】</p> <p>③ フルオロウラシル(5-FU) 500mg/m<sup>2</sup>【5分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>3週間毎に実施</p> |     |
| C50-02           | 乳癌 | 乳癌 ドセタキセル                 | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ドセタキセル注 60mg/m<sup>2</sup>【60分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>3週間毎に実施</p>   |     |
| C50-10<br>C50-11 | 乳癌 | 乳癌 3週毎 トラスツズマブ            | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① トラスツズマブ注 【点滴静注】</p> <p>※初回と2回目以降は、投与量と投与時間が違います。</p> <p>初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg 【初回90分、2回目以降30分】</p> <p>↓</p> <p>3週間毎に実施</p>  |     |
| C50-15           | 乳癌 | 乳癌 AC(ドキソルピシン+シクロフォスファミド) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ドキソルピシン注 60mg/m<sup>2</sup>【15分 点滴静注】</p> <p>② シクロスファミド(エンドキサン)注 600mg/m<sup>2</sup>【60分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>3週間ごとに実施</p>  |     |
| C50-16           | 乳癌 | 乳癌 TC(ドセタキセル+シクロフォスファミド)  | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ドセタキセル注 70mg/m<sup>2</sup>【60分 点滴静注】</p> <p>② シクロスファミド(エンドキサン)注 600mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>3週間ごとに実施</p>   |     |

| レジメンコード          | 分類 | レジメン名称                             | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|------------------|----|------------------------------------|--|-----|
| C50-17<br>C50-18 | 乳癌 | 乳癌TC+HER(ドセタキセル+シクロfosファミド+トラスツマブ) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>①ドセタキセル注 70mg/m<sup>2</sup>【60分 点滴静注】</p> <p>②シクロfosファミド(エンドキサン)注 600mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p> <p>③トラスツマブ注 → ※ 初回と2回目以降は、投与量と投与時間が違います。<br/>初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg【初回90分、2回目以降30分】</p> <p>↓</p> <p>3週間ごとに実施</p>  |     |
| C50-20<br>C50-21 | 乳癌 | 乳癌 DOC+HER(ドセタキセル+トラスツマブ)          | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>①ドセタキセル注 60mg/m<sup>2</sup>【60分 点滴静注】</p> <p>②トラスツマブ注 → ※ 初回と2回目以降は、投与量と投与時間が違います。<br/>初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg【初回90分、2回目以降30分】</p> <p>↓</p> <p>3週間毎に実施</p>   |     |
| C50-25           | 乳癌 | 乳癌 ゲムシタピン                          | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1・8日目</p> <p>①ゲムシタピン注 1250mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>   |     |
| C50-30<br>C50-31 | 乳癌 | 乳癌 PTX+HER(パクリタキセル+トラスツマブ)         | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・8・15日目</p> <p>①パクリタキセル注 80mg/m<sup>2</sup>【60分 点滴静注】</p> <p>②トラスツマブ注 → ※ 初回と2回目以降は、投与量と投与時間が違います。<br/>初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg【初回90分、2回目以降30分 点滴静注】</p> <p>22日目</p> <p>①トラスツマブ注 2mg/kg【30分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>29日目から同様に実施</p> |     |

| レジメンコード          | 分類 | レジメン名称               | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|------------------|----|----------------------|--|-----|
| C50-38           | 乳癌 | 乳癌 3週毎アブラキサン         | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① アブラキサン注 260mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】<br/>↓<br/>22日目から同様に実施</p>  |     |
| C50-40           | 乳癌 | 乳癌 毎週 パクリタキセル        | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・8・15 日目<br/>① パクリタキセル注 80mg/m<sup>2</sup>【60分 点滴静注】</p> <p>1週間ごとに3回点滴静注し、2週間休薬します。</p>   |     |
| C50-41           | 乳癌 | 乳癌 毎週 ベバシズマブ+パクリタキセル | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・15 日目<br/>① ベバシズマブ(アバスチン)注 → ※ 初回と2回目以降は、投与時間が違います。<br/>10mg/kg【初回90分、2回目60分、3回目以降30分 点滴静注】<br/>② パクリタキセル注 90mg/m<sup>2</sup>【60分 点滴静注】</p> <p>8 日目<br/>① パクリタキセル注 90mg/m<sup>2</sup>【60分 点滴静注】</p> <p>1週間ごとに3回点滴静注し、2週間休薬します。</p> |     |
| C50-42           | 乳癌 | 乳癌 エリブリン             | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1・8 日目<br/>① エリブリン(ハラヴェン)注 1.4mg/m<sup>2</sup>【約5分 点滴静注】<br/>↓<br/>22日目から同様に実施</p>   |     |
| C50-43<br>C50-44 | 乳癌 | 乳癌 エリブリン+トラスツズマブ     | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1・8 日目<br/>① エリブリン(ハラヴェン)注 1.4mg/m<sup>2</sup>【約5分 点滴静注】<br/>② トラスツズマブ注 → ※ 初回と2回目以降は、投与量と投与時間が違います。<br/>初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg【初回90分、2回目以降30分 点滴静注】<br/>↓<br/>22日目から同様に実施</p>   |     |

| レジメンコード | 分類 | レジメン名称                            | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄                         |
|---------|----|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| C50-45  | 乳癌 | 乳癌 ナベルピン                          | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1・8日目</p> <p>① ナベルピン(ロゼウス)注 25mg/m<sup>2</sup>【約5分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>  |                             |
| C50-46  | 乳癌 | 乳癌 ベバシズマブ単独                       | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ベバシズマブ注(アバステン) 10mg/kg【30分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>15日目以降同様に実施</p>   |                             |
| C50-50  | 乳癌 | 乳癌 ペムブロリズマブ+パクリタキセル+カルボプラチン       | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペムブロリズマブ注(キイトルーダ) 200mg【30分】</p> <p>② パクリタキセル注 80mg/m<sup>2</sup>【3時間】</p> <p>③ カルボプラチン注 AUC5【60分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p> <p>※ 吐気止めの点滴などにより投与時間は約5時間です。</p> | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C50-51  | 乳癌 | 乳癌 ペムブロリズマブ+AC(ドキシソビシン+シクロホスファミド) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペムブロリズマブ注(キイトルーダ) 200mg【30分】</p> <p>② ドキシソビシン注 60mg/m<sup>2</sup>【15分 点滴静注】</p> <p>③ シクロホスファミド(エンドキサン)注 600mg/m<sup>2</sup>【60分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>3週間ごとに実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C50-53  | 乳癌 | 乳癌 3週毎 ペムブロリズマブ単独                 | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペムブロリズマブ(キイトルーダ)注 200mg【30分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |

| レジメンコード          | 分類 | レジメン名称            | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄                         |
|------------------|----|-------------------|---|-----------------------------|
| C50-54           | 乳癌 | 乳癌 6週毎 ペムブロリズマブ単独 | <p>【1クール 42日間】</p> <p>1日目<br/>① ペムブロリズマブ(キイトルーダ)注 400mg【30分】<br/>↓<br/>43日目から同様に実施</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C50-60           | 乳癌 | 乳癌 アテゾリズマブ+アブラキサン | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① アテゾリズマブ注(テセントリク) 840mg【初回60分】【以降30分】<br/>② アブラキサン(nab-パクリタキセル)注 100mg/m<sup>2</sup>【30分】</p> <p>8日目・15日目<br/>④ アブラキサン(nab-パクリタキセル)注 100mg/m<sup>2</sup>【30分】<br/>↓<br/>22日目から同様に実施<br/>※ 吐気止めの点滴もあります</p> | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>アテゾリズマブ  |
| C50-86<br>C50-87 | 乳癌 | 乳癌 フェスゴ           | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① フェスゴ注<br/>初回：フェスゴ注 IN【皮下注】<br/>2回目以降：フェスゴ注 MA【皮下注】<br/>5～10分ほどかけて大腿部(ふともも)に投与します。<br/>※ フェスゴは「ベルツズマブ+トラスツズマブ」の2つの成分が入っています。<br/>3週間ごとに実施します</p>   |                             |
| C50-88<br>C50-89 | 乳癌 | 乳癌 フェスゴ+ドセタキセル    | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① フェスゴ注<br/>初回：フェスゴ注 IN【皮下注】<br/>2回目以降：フェスゴ注 MA【皮下注】<br/>5～10分ほどかけて大腿部(ふともも)に投与します。<br/>※ フェスゴは「ベルツズマブ+トラスツズマブ」の2つの成分が入っています。<br/>② ドセタキセル注 60mg/m<sup>2</sup>【1時間 点滴静注】</p> <p>3週間ごとに実施します</p>             |                             |



| レジメンコード          | 分類 | レジメン名称                        | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄 |
|------------------|----|-------------------------------|---|-----|
| C50-93<br>C50-94 | 乳癌 | 乳癌 HPD(ペルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペルツズマブ(バージェタ)注<br/>初回840mg 2回目以降420mg【初回60分、2回目以降30分 点滴静注】</p> <p>② トラスツズマブ注 → ※ 初回と2回目以降は、投与量と投与時間が違います。<br/>初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg【初回90分、2回目以降30分 点滴静注】</p> <p>③ ドセタキセル注 75mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p> <p>3週間ごとに実施します</p> |     |
| C50-95<br>C50-96 | 乳癌 | 乳癌 HP (ペルツズマブ+トラスツズマブ)        | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペルツズマブ(バージェタ)注<br/>初回840mg 2回目以降420mg【初回60分、2回目以降30分 点滴静注】</p> <p>② トラスツズマブ注 ※ 初回と2回目以降は、投与量と投与時間が違います。<br/>初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg【初回90分、2回目以降30分 点滴静注】</p> <p>3週間ごとに実施します</p>   |     |
| C50-97           | 乳癌 | 乳癌 カドサイラ(T-DM1)               | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① カドサイラ注 → ※ 初回と2回目以降は、投与時間が違います。<br/>3.6mg/kg【初回90分、2回目以降30分 点滴静注】</p> <p>3週間ごとに実施します</p>   |     |
| C50-98           | 乳癌 | 乳癌 トラスツズマブ デルクステカン(エンハーツ)     | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① トラスツズマブ デルクステカン注(エンハーツ)<br/>5.4mg/kg【初回90分】【何もなければ2回目以降は30分】</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>   |     |

| レジメンコード                    | 分類   | レジメン名称                       | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|----------------------------|------|------------------------------|--|-----|
| C53-49<br>C53-51<br>C53-52 | 子宮頸癌 | 子宮頸癌 放射線併用 シスプラチン            | <p>【1クール 7日間】</p> <p>① シスプラチン注 40mg/m<sup>2</sup>【週1回 1時間 点滴静注】</p> <p>※ 通常上記①を5～6回実施します。<br/>                     ※ 投与前後に十分な水分を静注します。 また、吐気止めのお薬を使用します。<br/>                     ※ 放射線療法を併用します。</p>   |     |
| C53-53                     | 子宮頸癌 | 子宮頸癌 ネダプラチン(入院)              | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ネダプラチン注(アクプラ) 80mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】<br/>                     ↓<br/>                     29日目以降同様に実施</p> <p>※ 腎障害予防のために、十分な水分を点滴します。</p>  |     |
| C53-54<br>C53-55           | 子宮頸癌 | 子宮頸癌 毎週 TC (パクリタキセル+カルボプラチン) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① パクリタキセル注 80mg/m<sup>2</sup>【1時間 点滴静注】<br/>                     ② カルボプラチン注 AUC 5【1時間 点滴静注】</p> <p>8・15 日目<br/>                     ① パクリタキセル 80mg/m<sup>2</sup>【1時間】<br/>                     ↓<br/>                     22日目以降同様に実施</p> |     |
| C53-60                     | 子宮頸癌 | 子宮頸癌 TC (パクリタキセル+カルボプラチン)    | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① パクリタキセル 180mg/m<sup>2</sup>【3時間 点滴静注】<br/>                     ② カルボプラチン AUC 5【1時間 点滴静注】<br/>                     ↓<br/>                     22日目以降同様に実施</p>  |     |

| レジメンコード                    | 分類   | レジメン名称                             | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄 |
|----------------------------|------|------------------------------------|---|-----|
| C53-61                     | 子宮頸癌 | 子宮頸癌 TC+BV(パクリタキセル+カルボプラチン+ペバシズマブ) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① パクリタキセル注 180mg/m<sup>2</sup>【3時間 点滴静注】</p> <p>② カルボプラチン注 AUC 5【1時間 点滴静注】</p> <p>③ ペバシズマブ注(アバステン) 15mg/kg</p> <p>【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p>   |     |
| C53-62                     | 子宮頸癌 | 子宮頸癌 DC(ドセタキセル+カルボプラチン)            | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ドセタキセル注 70mg/m<sup>2</sup>【1時間 点滴静注】</p> <p>② カルボプラチン注 AUC 5【1時間 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p>   |     |
| C53-65                     | 子宮頸癌 | 子宮頸癌 TP(パクリタキセル+シスプラチン)            | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① パクリタキセル注 135mg/m<sup>2</sup>【3時間 点滴静注】</p> <p>② シスプラチン注 50mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p> <p>※ 腎障害予防のために、シスプラチン投与の前後数日間は十分な水分を点滴します。</p>  |     |
| C53-66<br>C53-67<br>C53-69 | 子宮頸癌 | 子宮頸癌 イリノテカン+ネダプラチン                 | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目</p> <p>① イリノテカン注 50mg/m<sup>2</sup>【90分 点滴静注】</p> <p>② ネダプラチン注(アクプラ) 60mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】</p> <p>8・15日目</p> <p>① イリノテカン注 50mg/m<sup>2</sup>【90分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>29日目以降同様に実施</p> <p>※ 1日目は腎障害予防のために、十分な水分を点滴します。</p> |     |

| レジメンコード | 分類   | レジメン名称                              | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄                         |
|---------|------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| C53-68  | 子宮頸癌 | 子宮頸癌 ノギテカン+シスプラチン                   | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ノギテカン(ハイカムチン)注 0.75mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】<br/>                     ② シスプラチン注 50mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】</p> <p>2・3日目<br/>                     ① ノギテカン(ハイカムチン)注 0.75mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】<br/>                     ↓<br/>                     22日目以降、同様に実施<br/>                     ※ 腎障害予防のために、シスプラチン投与の前後に十分な水分を点滴します。</p>                |                             |
| C53-80  | 子宮頸癌 | 子宮頸癌 ペムブロリズマブ+パクリタキセル+シスプラチン        | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ペムブロリズマブ注(キイトルーダ) 200mg【30分】<br/>                     ② パクリタキセル注 175mg/m<sup>2</sup>【3時間】<br/>                     ③ シスプラチン注 50mg/m<sup>2</sup>【90分】<br/>                     ↓<br/>                     22日目以降から同様に実施<br/>                     ※ 吐気止めの点滴、腎機能低下予防の点滴により投与時間は約12時間です。</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C53-81  | 子宮頸癌 | 子宮頸癌 ペムブロリズマブ+パクリタキセル+シスプラチン+ベバシズマブ | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ペムブロリズマブ注(キイトルーダ) 200mg【30分】<br/>                     ② パクリタキセル注 175mg/m<sup>2</sup>【3時間】<br/>                     ③ シスプラチン注 50mg/m<sup>2</sup>【90分】<br/>                     ④ ベバシズマブ注(アバスチン) 15mg/kg【90～30分】<br/>                     ↓<br/>                     22日目以降から同様に実施<br/>                     ※ 吐気止めの点滴、腎機能低下予防の点滴により投与時間は約14～13時間です。</p> | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C53-82  | 子宮頸癌 | 子宮頸癌 ペムブロリズマブ+パクリタキセル+カルボプラチン       | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ペムブロリズマブ注(キイトルーダ) 200mg【30分】<br/>                     ② パクリタキセル注 175mg/m<sup>2</sup>【3時間】<br/>                     ③ カルボプラチン注 AUC5【60分】<br/>                     ↓<br/>                     22日目から同様に実施<br/>                     ※ 吐気止めの点滴などにより投与時間は約5時間です。</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |

| レジメンコード | 分類   | レジメン名称                               | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄                         |
|---------|------|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| C53-83  | 子宮頸癌 | 子宮頸癌 ペムブロリズマブ+パクリタキセル+カルボプラチン+ペバシズマブ | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペムブロリズマブ注(キイトルーダ) 200mg 【30分】</p> <p>② パクリタキセル注 175mg/m<sup>2</sup> 【3時間】</p> <p>③ カルボプラチン注 AUC5 【60分】</p> <p>④ ペバシズマブ注(アバスチン) 15mg/kg 【90～30分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p> <p>※ 吐気止めの点滴などにより投与時間は約7～6時間です。</p> | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C53-84  | 子宮頸癌 | 子宮頸癌 ペムブロリズマブ(3週毎)                   | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペムブロリズマブ(キイトルーダ)注 200mg 【30分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C53-85  | 子宮頸癌 | 子宮頸癌 ペムブロリズマブ(6週毎)                   | <p>【1クール 42日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペムブロリズマブ(キイトルーダ)注 400mg 【30分】</p> <p>↓</p> <p>43日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C53-86  | 子宮頸癌 | 子宮頸癌 セミプリマブ(3週毎)                     | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① セミプリマブ(リブタヨ)注 350mg 【30分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>セミプリマブ   |

| レジメンコード          | 分類      | レジメン名称                       | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|------------------|---------|------------------------------|--|-----|
| C54-36           | 子宮癌肉腫   | 子宮癌肉腫 IP (シスプラチン+イホスファミド)    | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1～5日目</p> <p>① シスプラチン注 20mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】</p> <p>② イホスファミド注 1500mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p> <p>※ 副作用軽減のため、5日間輸液を連続投与します。</p>  |     |
| C54-38           | 子宮癌肉腫   | 子宮癌肉腫 TI (パクリタキセル+イホスファミド)   | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① パクリタキセル注 135mg/m<sup>2</sup>【3時間 点滴静注】</p> <p>② イホスファミド注 (イホマイド) 1600mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】</p> <p>2～3日目</p> <p>① イホスファミド注 (イホマイド) 1600mg/m<sup>2</sup>【2時間】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p> <p>※ 副作用軽減のため、3日間輸液を連続投与します。</p> |     |
| C54-40           | 子宮平滑筋肉腫 | 子宮平滑筋肉腫 ドキソルビシン              | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ドキソルビシン注 60mg/m<sup>2</sup>【15分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p>   |     |
| C54-51<br>C54-52 | 子宮体癌    | 子宮体癌 毎週 TC (パクリタキセル+カルボプラチン) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① パクリタキセル注 80mg/m<sup>2</sup>【1時間 点滴静注】</p> <p>② カルボプラチン注 AUC5【1時間 点滴静注】</p> <p>8・15日目</p> <p>① パクリタキセル 80mg/m<sup>2</sup>【1時間】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p>   |     |

| レジメンコード | 分類   | レジメン名称                    | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄                                    |
|---------|------|---------------------------|---|--|
| C54-62  | 子宮体癌 | 子宮体癌 TC (パクリタキセル+カルボプラチン) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① パクリタキセル注 180mg/m<sup>2</sup>【3時間 点滴静注】</p> <p>② カルボプラチン注 AUC5【1時間 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p>  |  |
| C54-66  | 子宮体癌 | 子宮体癌 DC(ドセタキセル+カルボプラチン)   | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ドセタキセル注 70mg/m<sup>2</sup>【1時間 点滴静注】</p> <p>② カルボプラチン注 AUC5【1時間 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p>  |  |
| C54-68  | 子宮体癌 | 子宮体癌 AP(ドキシソルビシン+シスプラチン)  | <p>【1クール 21日間】</p> <p>※ 腎障害予防のために、治療の前後は十分な水分を点滴します。</p> <p>1日目</p> <p>① ドキシソルビシン注 60mg/m<sup>2</sup>【15分 点滴静注】</p> <p>② シスプラチン注 50mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p> |  |
| C54-69  | 子宮体癌 | 子宮体癌 DP(ドセタキセル+シスプラチン)    | <p>【1クール 21日間】</p> <p>※ 腎障害予防のために、十分な水分を点滴します。</p> <p>1日目</p> <p>① ドセタキセル注 70mg/m<sup>2</sup>【1時間 点滴静注】</p> <p>② シスプラチン注 60mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p>         |  |
| C54-80  | 子宮体癌 | 子宮体癌 3週毎 ペムブロリズマブ+レンパチニブ  | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペムブロリズマブ注(キイトルーダ) 200mg【1時間】</p> <p>1～21日目</p> <p>② レンパチニブ(レンビマ)錠 1回20mg【1日1回 連日 内服】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>                                       | <p>【免疫チェックポイント阻害薬】</p> <p>ペムブロリズマブ</p> |

| レジメンコード          | 分類   | レジメン名称                              | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄                         |
|------------------|------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| C54-81           | 子宮体癌 | 子宮体癌 6週毎 ペムブロリズマブ+レンパチニブ            | <p>【1クール 42日間】</p> <p>1日目<br/>① ペムブロリズマブ注(キイトルーダ) 400mg【1時間】<br/>1~42日目<br/>② レンパチニブ(レンビマ)錠 1回20mg【1日1回 連日 内服】<br/>↓<br/>43日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C56-21<br>C56-22 | 卵巣癌  | 卵巣癌 毎週 TC (パクリタキセル+カルボプラチン)         | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① パクリタキセル注 80mg/m<sup>2</sup>【1時間 点滴静注】<br/>② カルボプラチン注 AUC5【1時間 点滴静注】</p> <p>8・15 日目<br/>① パクリタキセル注 80mg/m<sup>2</sup>【1時間】<br/>↓<br/>22日目以降同様に実施</p>  |                             |
| C56-24           | 卵巣癌  | 卵巣癌 毎週TC+BV(パクリタキセル+カルボプラチン+ベバシズマブ) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① パクリタキセル注 80mg/m<sup>2</sup>【3時間 点滴静注】<br/>② カルボプラチン注 AUC5【1時間 点滴静注】<br/>③ ベバシズマブ注(アバステン) 15mg/kg【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>8・15 日目<br/>① パクリタキセル注 80mg/m<sup>2</sup>【1時間】<br/>↓<br/>22日目以降同様に実施</p> |                             |
| C56-26           | 卵巣癌  | 卵巣癌 TC (パクリタキセル+カルボプラチン)            | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① パクリタキセル注 180mg/m<sup>2</sup>【3時間 点滴静注】<br/>② カルボプラチン注 AUC5【1時間 点滴静注】<br/>↓<br/>22日目以降同様に実施</p>   |                             |



| レジメンコード                              | 分類  | レジメン名称                           | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|--|-----|
| C56-28                               | 卵巣癌 | 卵巣癌 DC (ドセタキセル+カルボプラチン)          | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ドセタキセル注 70mg/m<sup>2</sup>【1時間 点滴静注】<br/>                     ② カルボプラチン注 AUC5【1時間 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p>   |     |
| C56-30                               | 卵巣癌 | 卵巣癌 TP (パクリタキセル+シスプラチン)          | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① パクリタキセル注 180mg/m<sup>2</sup>【3時間 点滴静注】<br/>                     ② シスプラチン注 50mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p> <p>※ 腎障害予防のために、シスプラチン投与の前後数日間は十分な水分を点滴します。</p>               |     |
| C56-31<br>C56-60                     | 卵巣癌 | 卵巣癌 イリノテカン (A法)                  | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目・8日目・15日目<br/>                     ① イリノテカン注 100mg/m<sup>2</sup>【90分 点滴静注】<br/>                     ※点滴静注します。</p> <p>↓</p> <p>2週間休薬し、29日目から同様に実施</p>  |     |
| C56-32<br>C56-33<br>C56-34<br>C56-63 | 卵巣癌 | 卵巣癌 イリノテカン (B法)                  | <p>【1クール 35日間】</p> <p>1日目・15日目<br/>                     ① イリノテカン 150mg/m<sup>2</sup>【90分 点滴静注】<br/>                     ※点滴静注します。</p> <p>↓</p> <p>3週間休薬し、36日目から同様に実施</p>   |     |
| C56-36                               | 卵巣癌 | 卵巣癌 DC+BV(ドセタキセル+カルボプラチン+ベバシズマブ) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ドセタキセル注 70mg/m<sup>2</sup>【1時間 点滴静注】<br/>                     ② カルボプラチン注 AUC5【1時間 点滴静注】<br/>                     ③ ベバシズマブ注(アバスチン) 15mg/kg【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p> |     |

| レジメンコード | 分類  | レジメン名称                                | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄 |
|---------|-----|---------------------------------------|---|-----|
| C56-38  | 卵巣癌 | 卵巣癌 TC+BV(パクリタキセル+カルボプラチン+ベバシズマブ)     | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① パクリタキセル注 180mg/m<sup>2</sup>【3時間 点滴静注】</p> <p>② カルボプラチン注 AUC5【1時間 点滴静注】</p> <p>③ ベバシズマブ注(アバステン) 15mg/kg【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p>                          |     |
| C56-39  | 卵巣癌 | 卵巣癌 PLD+BV(ドキシル+ベバシズマブ)               | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペグ化リポソームドキシソルビシン(ドキシル注) 40mg/m<sup>2</sup>【90分 点滴静注】</p> <p>② ベバシズマブ注(アバステン) 10mg/kg【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>15日目</p> <p>① ベバシズマブ注 10mg/kg(アバステン)</p> <p>↓</p> <p>29日目以降同様に実施</p> |     |
| C56-40  | 卵巣癌 | 卵巣癌 PLD+CBDCA+BV(ドキシル+カルボプラチン+ベバシズマブ) | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペグ化リポソームドキシソルビシン(ドキシル注) 30mg/m<sup>2</sup>【90分 点滴静注】</p> <p>② カルボプラチン注 AUC5【60分 点滴静注】</p> <p>③ ベバシズマブ注(アバステン) 15mg/kg【初回は90分 2回目は60分 3回目以降は30分】</p> <p>↓</p> <p>29日目以降同様に実施</p>            |     |
| C56-41  | 卵巣癌 | 卵巣癌 ドキシル単独                            | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペグ化リポソームドキシソルビシン(ドキシル注) 50mg/m<sup>2</sup>【90分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>29日目以降同様に実施</p>   |     |
| C56-42  | 卵巣癌 | 卵巣癌 ベバシズマブ単独                          | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ベバシズマブ注(アバステン) 15mg/kg【30分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p>   |     |

| レジメコード | 分類  | レジメ名称                       | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|--------|-----|-----------------------------|--|-----|
| C56-43 | 卵巣癌 | 卵巣癌 PLD+CBDCA(ドキシル+カルボプラチン) | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ベグ化リポソームドキシソルビシン(ドキシル注) 30mg/m<sup>2</sup>【90分 点滴静注】<br/>                     ② カルボプラチン注 AUC5【60分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>29日目以降同様に実施</p>   |     |
| C56-44 | 卵巣癌 | 卵巣癌 DG (ドセタキセル+ゲムシタビン)      | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ゲムシタビン注 800mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p> <p>8日目<br/>                     ① ドセタキセル注 70mg/m<sup>2</sup>【60分 点滴静注】<br/>                     ② ゲムシタビン注 800mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>29日目から同様に実施</p> |     |
| C56-46 | 卵巣癌 | 卵巣癌 ノギテカン                   | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1～5日目<br/>                     ① ノギテカン注(ハイカムチン) 1.5mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p>  |     |
| C56-48 | 卵巣癌 | 卵巣癌 ゲムシタビン                  | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・8・15日目<br/>                     ① ゲムシタビン注 1000mg/m<sup>2</sup>【30分】</p> <p>↓</p> <p>29日目から同様に実施</p>  |     |
| C56-70 | 卵巣癌 | 卵巣癌 オラパリブ+3週毎ベバシズマブ         | <p>【1クール 21日間】</p> <p>① アバスチン(ベバシズマブ)注 15mg/kg【点滴静注】<br/>                     初回90分、2回目60分、以降30分</p> <p>② リムパーザ錠(オラパリオブ)【内服】<br/>                     1回300mg 1日2回 連日内服</p>  |     |

| レジメンコード | 分類    | レジメン名称                       | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|---------|-------|------------------------------|--|-----|
| C56-90  | 卵巣癌   | 卵巣癌 IP(シスプラチン腹腔内投与)          | シスプラチン注100mg+生理食塩液500mL<br>【腹腔内に注入します】<br><br>医師の判断により、抗がん薬の注射を併用する場合があります。  |     |
| C56-91  | 卵巣癌   | 卵巣癌 IP(シスプラチン胸腔内投与)          | シスプラチン注50mg+生理食塩液500mL<br>【胸腔内に注入します】<br><br>医師の判断により、抗がん薬の注射を併用する場合があります。   |     |
| C58-10  | 絨毛性疾患 | 絨毛癌 メトトレキサート+エトポシド+アクチノマイシンD | 【1クール 14~21日間】<br>1日目<br>① メトトレキサート注 300mg【4時間 点滴静注】<br>② メトトレキサート注 150mg【5分 点滴静注】<br>③ アクチノマイシンD注(コスメゲン) 0.5mg【5分 点滴静注】<br>④ エトポシド注 100mg【1時間 点滴静注】<br>⑤ ロイコボリン注 7.5mg【5分 12時間おきに、計3回点滴静注】<br><br>2~5日目<br>① アクチノマイシンD注(コスメゲン) 0.5mg【5分 点滴静注】<br>② エトポシド注 100mg【1時間 点滴静注】 |     |
| C61-01  | 前立腺癌  | 前立腺癌 ドセタキセル                  | 【1クール 21日間】<br>① 吐気止め・アレルギー予防の点滴【15分 点滴静注】<br>② ドセタキセル注 75mg/m <sup>2</sup> 【60分 点滴静注】<br>↓<br>22日目以降同様に実施   |     |
| C61-02  | 前立腺癌  | 前立腺癌 カバジタキセル                 | 【1クール 21日間】<br>① 吐気止め・アレルギー予防の点滴【15分 点滴静注】<br>② カバジタキセル注(ジェブタナ) 25mg/m <sup>2</sup> 【60分 点滴静注】<br>↓<br>22日目以降同様に実施   |     |

| レジメンコード | 分類   | レジメン名称               | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄                             |
|---------|------|----------------------|--|---------------------------------|
| C64-10  | 腎細胞癌 | 腎細胞癌 ニボルマブ(2週毎)      | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① ニボルマブ(オプジーボ)注 240mg【30分】</p> <p>↓</p> <p>15日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ        |
| C64-11  | 腎細胞癌 | 腎細胞癌 ニボルマブ+イピリムマブ    | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① ニボルマブ(オプジーボ)注 240mg【1時間】<br/>② イピリムマブ(ヤーポイ)注 1mg/kg【30分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施<br/>※ イピリムマブ注は4回を上限として投与します。<br/>※ ①と②の間は30分間 経過観察をします。</p> | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ、イピリムマブ |
| C64-12  | 腎細胞癌 | 腎細胞癌 ニボルマブ(4週毎)      | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>① ニボルマブ(オプジーボ)注 480mg【30分】</p> <p>↓</p> <p>29日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ        |
| C64-20  | 腎細胞癌 | 腎細胞癌 ペムブロリズマブ+アキシチニブ | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① ペムブロリズマブ注(キイトルーダ) 200mg【30分】<br/>1~14日目<br/>② アキシチニブ(インライタ)錠 1回5mg【1日2回 内服】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>                                      | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ     |
| C64-21  | 腎細胞癌 | 腎細胞癌 ペムブロリズマブ+レンパチニブ | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① ペムブロリズマブ注(キイトルーダ)200mg【30分】<br/>1~14日目<br/>② レンパチニブ(レンビマ)錠 1回20mg【1日1回 内服】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>                                       | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ     |

| レジメンコード | 分類     | レジメン名称                | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄                      |
|---------|--------|-----------------------|---|--------------------------|
| C64-23  | 腎細胞癌   | 腎細胞癌 2週毎ニボルマブ+カボザンチニブ | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① ニボルマブ注(オブジーボ) 240mg【1時間】<br/>1～14日目<br/>② カボザンチニブ(カボメティクス)錠 1回40mg【1日1回 空腹時に内服】<br/>↓<br/>15日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ |
| C64-24  | 腎細胞癌   | 腎細胞癌 4週毎ニボルマブ+カボザンチニブ | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>① ニボルマブ注(オブジーボ) 480mg【1時間】<br/>1～28日目<br/>② カボザンチニブ(カボメティクス)錠 1回40mg【1日1回 空腹時に内服】<br/>↓<br/>29日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ |
| C64-30  | 腎細胞癌   | 腎細胞癌 アベルマブ+アキシチニブ     | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① アベルマブ注(バベンチオ) 10mg/kg【1時間】<br/>1～14日目<br/>② アキシチニブ(インライタ)錠1回5mg【1日2回 内服】<br/>↓<br/>15日目から同様に実施</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>アベルマブ |
| C67-01  | 膀胱・尿路癌 | 尿路上皮癌 パクリタキセル+ゲムシタビン  | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>① パクリタキセル注 180mg/m<sup>2</sup>【3時間 点滴静注】<br/>② ゲムシタビン注 1000mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】<br/><br/>8日目<br/>③ ゲムシタビン注 1000mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】<br/>15日目<br/>④ ゲムシタビン注 1000mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p> |                          |

| レジメコード           | 分類     | レジメ名称                           | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄 |
|------------------|--------|---------------------------------|---|-----|
| C68-01<br>C68-02 | 膀胱・尿路癌 | 尿路上皮癌 GEM+CDDP(ゲムシタビン+シスプラチン)   | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>① ゲムシタビン注 1000mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p> <p>2日目<br/>② シスプラチン注 70mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】<br/>※ 腎障害予防のために、シスプラチン投与の前後数日間は十分な水分を点滴します。</p> <p>8日目<br/>③ ゲムシタビン注 1000mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p> <p>15日目<br/>④ ゲムシタビン注 1000mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p> |     |
| C68-04           | 膀胱・尿路癌 | 尿路上皮癌 GEM+CBDCA(ゲムシタビン+カルボプラチン) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① ゲムシタビン注 1000mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】<br/>② カルボプラチン注 AUC5【60分 点滴静注】</p> <p>8日目<br/>③ ゲムシタビン注 1000mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p>  |     |
| C68-05           | 膀胱・尿路癌 | 尿路上皮癌 ゲムシタビン                    | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・8・15日目<br/>① ゲムシタビン注 1000mg/m<sup>2</sup>【30分】</p> <p>↓<br/>29日目から同様に実施</p>   |     |

| レジメンコード | 分類     | レジメン名称              | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄                         |
|---------|--------|---------------------|--|-----------------------------|
| C68-08  | 膀胱・尿路癌 | 尿路上皮癌 M-VAC         | <p>【1クール 28日間】</p> <p>※ 腎障害予防のために、治療の前後は十分な水分を点滴します。</p> <p>*1日目<br/>① メソトレキセート注 30mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p> <p>*2日目<br/>② ビンブラスチン注(エクザール) 3mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】<br/>③ ドキソルビシン注 30mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】<br/>④ シスプラチン注 70mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】</p> <p>*15日目<br/>⑤ メソトレキセート注 30mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】<br/>⑥ ビンブラスチン注(エクザール) 3mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p> <p>*22日目<br/>⑦ メソトレキセート注 30mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】<br/>⑧ ビンブラスチン注(エクザール) 3mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p> |                             |
| C68-10  | 尿路上皮癌  | 尿路上皮癌 ペムブロリズマブ(3週毎) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① ペムブロリズマブ(キイトルーダ)注【30分】200mg</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C68-11  | 尿路上皮癌  | 尿路上皮癌 ペムブロリズマブ(6週毎) | <p>【1クール 42日間】</p> <p>1日目<br/>① ペムブロリズマブ(キイトルーダ)注【30分】400mg</p> <p>↓</p> <p>43日目から同様に実施</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C68-12  | 尿路上皮癌  | 尿路上皮癌 ニボルマブ(2週毎)    | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① ニボルマブ(オプジーボ)注【30分】240mg</p> <p>↓</p> <p>15日目から同様に実施</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ    |



| レジメンコード | 分類     | レジメン名称                        | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄                      |
|---------|--------|-------------------------------|---|--------------------------|
| C68-13  | 尿路上皮癌  | 尿路上皮癌 ニボルマブ(4週毎)              | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>① ニボルマブ(オプジーボ)注【30分】480mg</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>29日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ |
| C68-20  | 尿路上皮癌  | 尿路上皮癌 アベルマブ                   | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① アベルマブ(パベンチオ)注【1時間】10mg/kg</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>15日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>アベルマブ |
| C68-50  | 膀胱・尿路癌 | 尿路上皮癌 エンホルツマブ ベドチン            | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・8・15日目<br/>① エンホルツマブ ベドチン(パドセブ)注【30分】1.25mg/kg</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>29日目から同様に実施</p>                                |                          |
| C71-01  | 悪性神経腫  | 悪性神経腫 腫 TMZ+BEV (初発放射線併用期・経口) | <p>【1クール 70日間】</p> <p>1・15・29・42日目<br/>① ベバシズマブ注(アバステン) 10mg/kg【30分 点滴静注】</p> <p>1~42日目<br/>② テモゾロミド(テモダールカプセル)<br/>1回75mg/m<sup>2</sup>【1日1回 42日間内服し、28日間休薬】</p> |                          |

| レジメンコード | 分類      | レジメン名称                                 | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|---------|---------|--|--|-----|
| C71-02  | 悪性神経膠腫  | 悪性神経膠腫 TMZ+BEV (維持療法期・経口)              | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・15日目<br/>① ベバシズマブ注(アバステン) 10mg/kg 【30分 点滴静注】</p> <p>1～5日目<br/>② テモゾロミド(テモダールカプセル)<br/>1回150mg/m<sup>2</sup> 【1日1回 5日間内服し、23日間休薬】<br/>次クール以降1回200mg/m<sup>2</sup>可能<br/>↓<br/>29日目以降同様に実施</p> |     |
| C71-04  | 悪性神経膠腫  | 悪性神経膠腫 BEV 15mg/kg(単剤療法期)              | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① ベバシズマブ注(アバステン) 15mg/kg 【30分 点滴静注】<br/>↓<br/>22日目以降同様に実施</p>  |     |
| C71-05  | 悪性神経膠腫  | 悪性神経膠腫 BEV 10mg/kg(単発単剤療法)             | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① ベバシズマブ注(アバステン) 10mg/kg 【30分 点滴静注】<br/>↓<br/>15日目以降同様に実施</p>  |     |
| C74-10  | 悪性褐色細胞腫 | 悪性褐色細胞腫 CVD(シクロfosファミド+ビンクリスチン+ダカルバジン) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① ダカルバジン注 600mg/m<sup>2</sup> 【1時間 点滴静注】<br/>② ビンクリスチン注(オンコビン) 1.4mg/m<sup>2</sup> 【約5分 点滴静注】<br/>③ シクロfosファミド注(エンドキサン) 750mg/m<sup>2</sup> 【1時間 点滴静注】<br/>↓<br/>3週間毎に実施</p>           |     |

| レジメコード           | 分類   | レジメ名称                           | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|------------------|------|---------------------------------|--|-----|
| C76-01<br>C76-02 | 頭頸部癌 | 頭頸部癌 セツキシマブ+パクリタキセル             | <p>【1クール 49日間】</p> <p>1・8・15・22・29・36 日目</p> <p>① セツキシマブ注(アービタックス) 400mg/m<sup>2</sup> 【初回120分、点滴静注】<br/>250mg/m<sup>2</sup> 【2回目以降60分 点滴静注】</p> <p>② パクリタキセル注 80mg/kg【60分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>50日目以降に同様に実施</p> <p>※ 副作用の発現状況により、投与スケジュールや投与量に変更される場合があります。</p>  |     |
| C76-07<br>C76-08 | 頭頸部癌 | 頭頸部癌 セツキシマブ+FP(フルオロウラシル+シスプラチン) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① フルオロウラシル注 1000mg/m<sup>2</sup>【24時間】</p> <p>② セツキシマブ注(アービタックス) 400mg/m<sup>2</sup>【初回 2時間】 250mg/m<sup>2</sup>【2回目以降 1時間】</p> <p>③ シスプラチン注 100mg/m<sup>2</sup>【120分】</p> <p>※ 1日目抗がん剤投与の前後に、吐気止めおよび腎障害予防のための補液を点滴します。</p> <p>2～4日目</p> <p>④ フルオロウラシル注 1000mg/m<sup>2</sup>【24時間】</p> <p>8日目、15日目</p> <p>⑤ セツキシマブ注(アービタックス) 250mg/m<sup>2</sup>【1時間】</p> |     |
| C76-11<br>C76-12 | 頭頸部癌 | 頭頸部癌 セツキシマブ                     | <p>【1クール 7日間】</p> <p>① セツキシマブ注(アービタックス) 400mg/m<sup>2</sup>【初回 2時間】 250mg/m<sup>2</sup>【2回目以降 1時間】</p> <p>※ 放射線併用の場合、放射線治療期間中に週1回投与します。</p> <p>※ 副作用の発現状況により、投与スケジュールや投与量に変更される場合があります。</p>  |     |

| レジメンコード | 分類   | レジメン名称                         | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|---------|------|--------------------------------|--|-----|
| C76-22  | 頭頸部癌 | 頭頸部癌 シスプラチン+フルオロウラシル(100/1000) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① フルオロウラシル(5-FU)注 1000mg/m<sup>2</sup>【24時間持続静注】<br/>+シスプラチン 100mg/m<sup>2</sup>【2時間】</p> <p>2～4日目<br/>② フルオロウラシル(5-FU)注 1000mg/m<sup>2</sup>【24時間持続静注】<br/>※投与前後に十分な水分を点滴します。また、吐気止めのお薬を使用します。</p>    |     |
| C76-23  | 頭頸部癌 | 頭頸部癌 シスプラチン+フルオロウラシル(80/800)   | <p>【1クール 21～28日間】</p> <p>1日目<br/>① フルオロウラシル(5-FU)注 800mg/m<sup>2</sup>【24時間持続静注】<br/>+シスプラチン 80mg/m<sup>2</sup>【2時間】</p> <p>2～5日目<br/>② フルオロウラシル(5-FU)注 800mg/m<sup>2</sup>【24時間持続静注】</p> <p>※投与前後に十分な水分を点滴します。また、吐気止めのお薬を使用します。</p> |     |
| C76-24  | 頭頸部癌 | 頭頸部癌 シスプラチン+放射線                | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① シスプラチン注 100mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】<br/>※ 腎障害予防のため、十分な水分量の点滴があります。<br/>↓<br/>22日目から同様に実施</p>   |     |
| C76-28  | 頭頸部癌 | 頭頸部癌 毎週パクリタキセル                 | <p>【1クール 49日間】</p> <p>1・8・15・22・29・36日目 (1週間ごとに点滴)<br/>① パクリタキセル注 100mg/m<sup>2</sup>【1時間 点滴静注】</p> <p>※ 36日目以降、体力を回復させるため2週間休薬します。</p>  |     |

| レジメンコード | 分類   | レジメン名称             | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄                         |
|---------|------|--------------------|--|-----------------------------|
| C76-30  | 頭頸部癌 | 頭頸部癌 ドセタキセル        | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① ドセタキセル注 60mg/m<sup>2</sup>【60分 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>3週間毎に実施</p> |                             |
| C76-50  | 頭頸部癌 | 頭頸部癌 ニボルマブ(2週毎)    | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① ニボルマブ(オブジーボ)注 240mg【1時間】</p> <p>↓</p> <p>15日目から同様に実施</p>         | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ    |
| C76-51  | 頭頸部癌 | 頭頸部癌 ニボルマブ(4週毎)    | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>① ニボルマブ(オブジーボ)注 480mg【1時間】</p> <p>↓</p> <p>29日目から同様に実施</p>         | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ    |
| C76-60  | 頭頸部癌 | 頭頸部癌 ペムブロリズマブ(3週毎) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① ペムブロリズマブ(キイトルーダ)注 200mg【30分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>     | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C76-61  | 頭頸部癌 | 頭頸部癌 ペムブロリズマブ(6週毎) | <p>【1クール 42日間】</p> <p>1日目<br/>① ペムブロリズマブ(キイトルーダ)注 400mg【30分】</p> <p>↓</p> <p>43日目から同様に実施</p>     | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |

| レジメンコード | 分類    | レジメン名称            | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|---------|-------|-------------------|--|-----|
| C80-01  | 胚細胞腫瘍 | 胚細胞腫瘍BEP          | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① プレオマイシン(プレオ)注 30mg【30分 点滴静注】<br/>                     ② エトポシド注 100mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】<br/>                     ③ シスプラチン注 20mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】</p> <p>2～5日目<br/>                     ① エトポシド注 100mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】<br/>                     ② シスプラチン注 20mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】</p> <p>8・15日目<br/>                     ① プレオマイシン(プレオ)注 30mg【30分 点滴静注】<br/>                     ↓<br/>                     22日目以降同様に実施</p> |     |
| C80-01  | NEC   | NEC シスプラチン+エトポシド  | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ①エトポシド注 100mg/m<sup>2</sup>【120分】<br/>                     ②シスプラチン注 800mg/m<sup>2</sup>【60分】<br/>                     ※ 抗がん剤投与に伴い、加えて吐気止め及び腎障害予防のための点滴があります。</p> <p>2・3日目<br/>                     ①エトポシド注 100mg/m<sup>2</sup>【120分】<br/>                     ↓<br/>                     22日目から同様に実施</p>  |     |
| C80-02  | NEC   | NEC シスプラチン+イリノテカン | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>                     ①イリノテカン注 60mg/m<sup>2</sup>【90分】<br/>                     ②シスプラチン注 60mg/m<sup>2</sup>【60分】<br/>                     ※ 抗がん剤投与に加えて腎障害予防のための点滴があります。</p> <p>8・15日目<br/>                     ①イリノテカン注 60mg/m<sup>2</sup>【90分】<br/>                     ↓<br/>                     29日目から同様に実施</p>   |     |

| レジメンコード | 分類           | レジメン名称                    | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄                         |
|---------|--------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| C80-11  | 原発不明癌        | 原発不明癌 3週毎 パクリタキセル+カルホプラチン | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① パクリタキセル注 180mg/m<sup>2</sup>【3時間 点滴静注】</p> <p>② カルボプラチン注 AUC5【1時間 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p>  |                             |
| C80-12  | 原発不明癌        | 原発不明癌 毎週 パクリタキセル+カルホプラチン  | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① パクリタキセル注 80mg/m<sup>2</sup> 【1時間 点滴静注】</p> <p>② カルボプラチン注 AUC5【1時間 点滴静注】</p> <p>8・15 日目</p> <p>① パクリタキセル 80mg/m<sup>2</sup> 【1時間】</p> <p>↓</p> <p>22日目以降同様に実施</p> |                             |
| C80-21  | MSI-High 固形癌 | MSI-High固形癌 ペムブロリズマブ(3週毎) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペムブロリズマブ(キイトルーダ)注 200mg【30分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C80-22  | MSI-High 固形癌 | MSI-High固形癌 ペムブロリズマブ(6週毎) | <p>【1クール 42日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ペムブロリズマブ(キイトルーダ)注 400mg【30分】</p> <p>↓</p> <p>43日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C80-30  | 原発不明癌        | 原発不明癌 2週毎 ニボルマブ           | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ニボルマブ(オプジーボ)注 240mg【30分】</p> <p>↓</p> <p>15日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ    |

| レジメンコード | 分類          | レジメン名称                    | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄                         |
|---------|-------------|---------------------------|--|-----------------------------|
| C80-31  | 原発不明癌       | 原発不明癌 4週毎 ニボルマブ           | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目<br/>① ニボルマブ(オプジーボ)注 480mg【30分】</p> <p>↓</p> <p>29日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ    |
| C80-31  | TMB-High固形癌 | TMB-High固形癌 ペムブロリズマブ(3週毎) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>① ペムブロリズマブ(キイトルーダ)注 200mg【30分】</p> <p>↓</p> <p>22日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C80-32  | TMB-High固形癌 | TMB-High固形癌 ペムブロリズマブ(6週毎) | <p>【1クール 42日間】</p> <p>1日目<br/>① ペムブロリズマブ(キイトルーダ)注 400mg【30分】</p> <p>↓</p> <p>43日目から同様に実施</p>   | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ペムブロリズマブ |
| C81-05  | ホジキンリンパ腫    | ホジキンリンパ腫 ABVd(EPI)        | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① プレオマイシン(ブレオ) 9mg/m<sup>2</sup>【1時間 点滴静注】<br/>② ビンブラスチン(エクザール) 6mg/m<sup>2</sup>【約10分 点滴静注】<br/>③ エピルビシン 25mg/m<sup>2</sup>【5分 点滴静注】<br/>④ ダカルバジン 250mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>2週間毎に実施</p>         |                             |
| C81-06  | ホジキンリンパ腫    | ホジキンリンパ腫 ABVd(THP)        | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目<br/>① プレオマイシン(ブレオ) 9mg/m<sup>2</sup>【1時間 点滴静注】<br/>② ビンブラスチン(エクザール) 6mg/m<sup>2</sup>【約10分 点滴静注】<br/>③ ピラルビシン(ピノルビン) 25mg/m<sup>2</sup>【1時間 点滴静注】<br/>④ ダカルバジン 250mg/m<sup>2</sup>【2時間 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>2週間毎に実施</p> |                             |



| レジメンコード | 分類       | レジメン名称                     | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄                      |
|---------|----------|----------------------------|--|--------------------------|
| C81-07  | ホジキンリンパ腫 | ホジキンリンパ腫 ABVD (DXR)        | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ドキソルビシン注 25mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p> <p>② プレオマイシン注 9mg/m<sup>2</sup>【約5分 点滴静注】</p> <p>③ ビンブラスチン(エクザール)注 6mg/m<sup>2</sup>【約5分 点滴静注】</p> <p>④ ダカルバジン注 375mg/m<sup>2</sup>【1時間 点滴静注】</p> <p>↓</p> <p>2週間毎に実施</p>     |                          |
| C81-10  | ホジキンリンパ腫 | ホジキンリンパ腫 プレンツキシマブ ベドチン     | <p>【1クール 21日間】</p> <p>① プレンツキシマブ ベドチン注(アドセトリス) 1.8mg/kg【60分 点滴静注】</p>  |                          |
| C81-11  | ホジキンリンパ腫 | ホジキンリンパ腫 プレンツキシマブ ベドチン+AVD | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目、15日目</p> <p>① ドキソルビシン注 25mg/m<sup>2</sup>【15分 点滴静注】</p> <p>② ビンブラスチン注(エクザール) 6mg/m<sup>2</sup>【5分 点滴静注】</p> <p>③ ダカルバジン注 375mg/m<sup>2</sup>【120分】</p> <p>④ プレンツキシマブ ベドチン注(アドセトリス) 1.2mg/kg【60分 点滴静注】</p> <p>途中、吐気止めの点滴をします。</p> |                          |
| C81-20  | ホジキンリンパ腫 | ホジキンリンパ腫 ニボルマブ(2週毎)        | <p>【1クール 14日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ニボルマブ(オプジーボ)注 240mg【30分】</p> <p>↓</p> <p>15日目から同様に実施</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ |
| C81-21  | ホジキンリンパ腫 | ホジキンリンパ腫 ニボルマブ(4週毎)        | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ニボルマブ(オプジーボ)注 480mg【30分】</p> <p>↓</p> <p>29日目から同様に実施</p>  | 【免疫チェックポイント阻害薬】<br>ニボルマブ |

| レジメンコード | 分類        | レジメン名称                                 | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|---------|-----------|--|--|-----|
| C84-10  |           | T細胞リンパ腫 プラトレキサート                       | <p>【1クール 49日間】</p> <p>1、8、15、22、29、36日目</p> <p>① プラトレキサート注(ジフォルタ) 30mg/m<sup>2</sup><br/>【3～5分かけて静脈内投与】</p> <p>↓</p> <p>50日目から同様に実施</p>  |     |
| C85-04  | 非ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 寛解導入 リツキシマブ                  | <p>【1クール 56日間】</p> <p>1・8・15・22・29・36・43・50日目</p> <p>① リツキシマブ注 375mg/m<sup>2</sup>【初回200分、2回目以降135分 点滴静注】</p> <p>※ 実施前に副作用予防のため、抗ヒスタミン剤と鎮痛解熱剤を内服します。</p>                                     |     |
| C85-05  | 非ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 維持 リツキシマブ                    | <p>【1クール 通常8週間】</p> <p>① リツキシマブ注 375mg/m<sup>2</sup>【135分 点滴静注】</p> <p>※ 実施前に副作用予防のため、抗ヒスタミン剤と鎮痛解熱剤を内服します。</p>   |     |
| C85-10  | 非ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 RB (リツキシマブ+ベンダムスチン)          | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1日目</p> <p>① リツキシマブ注 375mg/m<sup>2</sup>【135分 点滴静注】</p> <p>2・3日目</p> <p>② ベンダムスチン注(トリアキシン) 90mg/m<sup>2</sup>【60分 点滴静注】</p> <p>※ 実施前に副作用予防のため、抗ヒスタミン剤と鎮痛解熱剤を内服します。</p> |     |
| C85-11  | 非ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 ベンダムスチン 120mg/m <sup>2</sup> | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目 および 2日目</p> <p>① ベンダムスチン注(トリアキシン) 120mg/m<sup>2</sup>【60分 点滴静注】</p>  |     |

| レジメンコード          | 分類        | レジメン名称                                    | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄 |
|------------------|-----------|---|---|-----|
| C85-12<br>C85-13 | 非ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 Pola-RB (リツキシマブ+ポラツズマブ+ベンダムスチン) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>「初回」</p> <p>1日目 リツキシマブ注 375mg/m<sup>2</sup> 【約230分 点滴静注】</p> <p>2日目 ポラツズマブ ベドチン注(ポライビー) 1.8mg/kg<br/>【90分 点滴静注】</p> <p>ベンダムスチン注(トレアキシン) 90mg/m<sup>2</sup><br/>【60分 点滴静注】</p> <p>3日目 ベンダムスチン注(トレアキシン) 90mg/m<sup>2</sup><br/>【60分 点滴静注】</p> <p>「2回目以降」</p> <p>1日目 リツキシマブ注 375mg/m<sup>2</sup> 【約150分 点滴静注】</p> <p>ポラツズマブ ベドチン注(ポライビー) 1.8mg/kg<br/>【30分 点滴静注】</p> <p>ベンダムスチン注(トレアキシン) 90mg/m<sup>2</sup><br/>【60分 点滴静注】</p> <p>2日目 ベンダムスチン注(トレアキシン) 90mg/m<sup>2</sup><br/>【60分 点滴静注】</p> <p>※ 各薬剤点滴の途中、経過観察のための時間をはさみます。</p> |     |
| C85-14           | 非ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 CHOP                            | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① ビンクリスチン注(オンコビン) 1.4mg/m<sup>2</sup><br/>【約5分 点滴静注】</p> <p>② ドキソルビシン注 50mg/m<sup>2</sup><br/>【30分 点滴静注】</p> <p>③ シクロフォスファミド注(エンドキサン) 750mg/m<sup>2</sup><br/>【1時間 点滴静注】</p> <p>1・2・3・4・5日目</p> <p>④ プレドニゾロン錠(プレドニン) 50mg/m<sup>2</sup> 【内服】</p>   |     |
| C85-24<br>C85-25 | 非ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 R-CHOP                          | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① リツキシマブ注 375mg/m<sup>2</sup> 【初回200分、2回目以降135分 点滴静注】</p> <p>2日目</p> <p>① ビンクリスチン注(オンコビン) 1.4mg/m<sup>2</sup> 【約5分 点滴静注】</p> <p>② ドキソルビシン注 50mg/m<sup>2</sup> 【30分 点滴静注】</p> <p>③ シクロフォスファミド注(エンドキサン) 750mg/m<sup>2</sup> 【1時間 点滴静注】</p>   |     |

| レジメンコード          | 分類        | レジメン名称                       | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|------------------|-----------|------------------------------|--|-----|
|                  |           |                              | 2・3・4・5・6日目<br>④ プレドニゾロン錠(プレドニン) 50mg/m <sup>2</sup> 【内服】  |     |
| C85-28<br>C85-29 | 非ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 Pola-R+CHP         | <p>【1クール 21日間】<br/>「初回」</p> <p>① リツキシマブ注 375mg/m<sup>2</sup> 【約230分 点滴静注】<br/>② ポラツズマブ ベドチン注(ポライビー) 1.8mg/m<sup>2</sup> 【90分 点滴静注】<br/>③ シクロフォスファミド注(エンドキサン) 750mg/m<sup>2</sup> 【60分 点滴静注】<br/>④ ドキソルビシン注 50mg/m<sup>2</sup> 【30分 点滴静注】</p> <p>「2回目以降」</p> <p>① リツキシマブ注 375mg/m<sup>2</sup> 【約150分 点滴静注】<br/>② ポラツズマブ ベドチン注(ポライビー) 1.8mg/m<sup>2</sup> 【30分 点滴静注】<br/>③ シクロフォスファミド注(エンドキサン) 750mg/m<sup>2</sup> 【60分 点滴静注】<br/>④ ドキソルビシン注 50mg/m<sup>2</sup> 【30分 点滴静注】</p> <p>※ 各薬剤点滴の途中、経過観察のための時間をはさみます。</p> |     |
| C85-38<br>C85-39 | 非ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 オビヌツズマブ-CHOP (2分割) | <p>【1クール 21日間】<br/>(初回クールは1日目に①～⑤を実施し、8・15日目に①のみ実施)<br/>(2～6クールは1日目に①～④を実施)<br/>(7～8クールは1日目に①のみ実施)</p> <p>◆ 1・8・15日目<br/>① オビヌツズマブ注(ガザイバ) 1000mg 【初回255分、2回目以降195分 点滴静注】<br/>◆ 2日目<br/>② ビンクリスチン注(オンコビン) 1.4mg/m<sup>2</sup> 【約5分 点滴静注】<br/>③ ドキソルビシン注 50mg/m<sup>2</sup> 【30分 点滴静注】<br/>④ シクロフォスファミド注(エンドキサン) 750mg/m<sup>2</sup> 【1時間 点滴静注】<br/>◆ 1・2・3・4・5日目<br/>⑤ プレドニゾロン錠(プレドニン) 50mg/m<sup>2</sup> 【内服】</p>  |     |

| レジメンコード                    | 分類        | レジメン名称                    | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄 |
|----------------------------|-----------|---------------------------|---|-----|
| C85-40<br>C85-41<br>C85-42 | 非ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 オビヌツズマブ+CHOP    | <p>【1クール 21日間】</p> <p>(初回クールは1日目に①～⑤を実施し、8・15日目に①のみ実施)<br/>(2～6クールは1日目に①～④を実施)<br/>(7～8クールは1日目に①のみ実施)</p> <p>① オビヌツズマブ注(ガザイバ) 1000mg<br/>【初回255分、2回目以降195分 点滴静注】</p> <p>② ビンクリスチン注(オンコビン) 1.4mg/m<sup>2</sup><br/>【約5分 点滴静注】</p> <p>③ ドキソルビシン注 50mg/m<sup>2</sup><br/>【30分 点滴静注】</p> <p>④ シクロフォスファミド注(エンドキサン) 750mg/m<sup>2</sup><br/>【1時間 点滴静注】</p> <p>1・2・3・4・5 日目</p> <p>⑤ プレドニゾロン錠(プレドニン) 50mg/m<sup>2</sup> 【内服】</p> |     |
| C85-43<br>C85-44           | 非ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 オビヌツズマブ+CVP     | <p>【1クール 21日間】</p> <p>(初回クールは1日目に①～④を実施し、8・15日目に①のみ実施)<br/>(2～8クールは1日目に①～④を実施)</p> <p>① オビヌツズマブ注(ガザイバ) 1000mg<br/>【初回255分、2回目以降195分 点滴静注】</p> <p>② ビンクリスチン注(オンコビン) 1.4mg/m<sup>2</sup> 【約5分 点滴静注】</p> <p>③ シクロフォスファミド注(エンドキサン) 750mg/m<sup>2</sup> 【1時間 点滴静注】</p> <p>1・2・3・4・5 日目</p> <p>④ プレドニゾロン錠(プレドニン) 50mg/m<sup>2</sup> 【内服】</p>  |     |
| C85-45<br>C85-46           | 非ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 オビヌツズマブ+ベンダムスチン | <p>【1クール 28日間】</p> <p>(初回クールは1日目に①～②を実施し、2日目に②のみ実施。8・15日目は①のみ実施)<br/>(2～6クールは1日目に①～②を実施し、2日目に②のみ実施)</p> <p>① オビヌツズマブ注(ガザイバ) 1000mg<br/>【初回255分、2回目以降195分 点滴静注】</p> <p>② ベンダムスチン注(トレアキシ) 90mg/m<sup>2</sup> 【60分 点滴静注】</p>   |     |

| レジメコード                               | 分類        | レジメ名称               | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄 |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|---|-----|
| C85-47                               | 非ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 オビヌツズマブ単独 | <p>【1クール 56日間(8週間)】</p> <p>(初回クールは1日目に①～②を実施)<br/>(2クール以降は1日目に②のみ実施)</p> <p>① デキサメタゾン注(デキサート)【15分 点滴静注】<br/>② オビヌツズマブ注(ガザイバ) 1000mg【195分 点滴静注】</p>  |     |
| C85-49                               | 非ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 ロミデプシン    | <p>【1クール 28日間(4週間)】</p> <p>1・8・15日目</p> <p>① グラニセトロン注【15分 点滴静注】<br/>② ロミデプシン注(イストダックス) 14mg/m<sup>2</sup>【4時間 点滴静注】</p>   |     |
| C85-51<br>C85-52                     | 非ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 R-CEOP    | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① リツキシマブ注 375mg/m<sup>2</sup>【初回200分、2回目以降135分 点滴静注】</p> <p>2日目</p> <p>① ピンクリスチン注(オンコビン) 1.4mg/m<sup>2</sup>【約5分 点滴静注】<br/>② エトポシド注 50mg/m<sup>2</sup>【120分 点滴静注】<br/>③ シクロフォスファミド注(エンドキサン) 750mg/m<sup>2</sup>【1時間 点滴静注】</p> <p>2・3日目</p> <p>④ エトポシドカプセル(ベプシドカプセル) 100mg/m<sup>2</sup>【内服】</p> <p>2・3・4・5・6日目</p> <p>⑤ プレドニゾロン錠(プレドニン) 50mg/m<sup>2</sup>【内服】</p> |     |
| C85-57<br>C85-58<br>C85-59<br>C85-60 | 非ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 エプコリタマブ   | <p>【1～2クール 28日間】</p> <p>1日目・8日目・15日目・22日目</p> <p>① エプコリタマブ(エプキンリ)注【皮下注射】<br/>1日目:0.16mg 8日目:0.8mg 15日目:48mg 22日目:48mg</p> <p>【4～9クール 28日間】</p> <p>1日目・15日目</p> <p>① エプコリタマブ(エプキンリ)注【皮下注射】<br/>1日目:48mg 15日目:48mg</p> <p>【10クール以降 28日間】</p> <p>1日目</p> <p>① エプコリタマブ(エプキンリ)注【皮下注射】<br/>1日目:48mg</p>   |     |

| レジメコード | 分類        | レジメ名称                | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄 |
|--------|-----------|----------------------|---|-----|
| C85-72 | 非ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 DA-EPOCH   | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① エトポシド注 50mg/m<sup>2</sup><br/>                     + ビンクリスチン注(オンコビン) 50mg/m<sup>2</sup><br/>                     +ドキシソルビシン注 10mg/m<sup>2</sup><br/>                     【4日間(96時間) 点滴静注】</p> <p>1～5 日目<br/>                     ② プレドニゾロン錠(プレドニン) 60mg/m<sup>2</sup> 【内服】</p> <p>5日目<br/>                     ③ シクロフォスファミド注(エンドキサン) 750mg/m<sup>2</sup> 【2時間 点滴静注】</p>   |     |
| C85-73 | 非ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 DA-EPOCH-R | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1 日目<br/>                     ① リツキシマブ注 375mg/m<sup>2</sup> 【初回200分、2回目以降135分 点滴静注】</p> <p>② エトポシド注 50mg/m<sup>2</sup><br/>                     +ビンクリスチン注(オンコビン) 50mg/m<sup>2</sup><br/>                     +ドキシソルビシン注 10mg/m<sup>2</sup><br/>                     【4日間(96時間) 点滴静注】</p> <p>1～5 日目<br/>                     ③ プレドニゾロン錠(プレドニン)60mg/m<sup>2</sup> 【内服】</p> <p>5日目<br/>                     ④ シクロフォスファミド注(エンドキサン) 750mg/m<sup>2</sup> 【2時間 点滴静注】</p> |     |
| C90-01 | 多発性骨髄腫    | 多発性骨髄腫 VMMD          | <p>【1クール 42日間】</p> <p>1日目<br/>                     ① ビンデシン注(フィルデシン) 2.4mg/m<sup>2</sup>【約10分 点滴静注】<br/>                     ② ラニムスチン注(サイメリン) 40mg/m<sup>2</sup>【30分 点滴静注】</p> <p>2・3・4・5・6・7 日目<br/>                     ③ メルファラン錠(アルケラン) 8mg/m<sup>2</sup>【内服】</p> <p>2・3・4 日目<br/>                     ④ デキサメタゾン錠(デカドロン) 1日30～40mg 1日1～2回【内服】</p>   |     |

| レジメコード                     | 分類    | レジメ名称                              | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|----------------------------|-------|------------------------------------|--|-----|
| C90-03<br>C90-04           | 多発性骨腫 | 多発性骨髄腫 E-Ld(エロツズマブ+レナリドミド+デキサメタゾン) | <p>【1クール 28日間】 ※ 注射する前に副作用の予防薬を内服します。</p> <p>「1～2サイクル目」</p> <p>① デキサメタゾン錠(レナデックス錠) 1回28mg 1日1回【内服】 ※注射②実施の3～24時間前<br/>1・8・15・22日目</p> <p>② エロツズマブ注(エムプリシティ) 10mg/kg【注射】<br/>1～21日目</p> <p>③ レナリドミド錠(レブラミドカプセル)1回25mg 1日1回【内服】</p> <p>「3サイクル以降」</p> <p>① デキサメタゾン錠(レナデックス錠) 1回28mg 1日1回【内服】 ※注射②実施の3～24時間前<br/>1・15日目</p> <p>② エロツズマブ注(エムプリシティ) 10mg/kg【注射】<br/>1～21日目</p> <p>③ レナリドミド錠(レブラミドカプセル)1回25mg 1日1回【内服】</p>  |     |
| C90-15<br>C90-16<br>C90-19 | 多発性骨腫 | 多発性骨髄腫 ボルテゾミブ (BD・MBD・VMP)         | <p>BD療法(デキサメタゾン錠を併用)<br/>BMD療法・VMP療法(メルファラン錠+デキサメタゾン錠またはプレドニゾン錠を併用)</p> <p>「1～4サイクル目」</p> <p>【1クール 21日間】<br/>1・4・8・11日目 (休薬:12～21日目)</p> <p>① ボルテゾミブ注(ベルケイド) 1.3mg/m<sup>2</sup>【皮下注】</p> <p>「5サイクル以降」</p> <p>【1クール 21日間】<br/>1・8日目 (休薬:9～21日目)</p> <p>① ボルテゾミブ注(ベルケイド皮下注)【皮下注】</p> <p>※ 実際の投与スケジュールは症状に合わせて変更される場合があります。<br/>※ BD療法(デキサメタゾン錠 20mg/body を併用)<br/>BMD療法(メルファラン錠 8mg/m<sup>2</sup> +デキサメタゾン錠 20mg/body を併用)<br/>VMP療法(メルファラン錠 9mg/m<sup>2</sup>+プレドニゾン錠 60mg/m<sup>2</sup> を併用)<br/>※ 内服薬の投与量は、適宜調整します</p> |     |
| C90-17<br>C90-18           | 多発性骨腫 | 多発性骨髄腫 ボルテゾミブ (BD・MBD・VMP)         | <p>「1～8サイクル目」</p> <p>【1クール 21日間】<br/>1・4・8・11日目 (休薬:12～21日目)</p> <p>① ボルテゾミブ注(ベルケイド) 1.3mg/m<sup>2</sup>【皮下注】</p> <p>「9サイクル以降」</p> <p>【1クール 35日間】<br/>1・8・15・22日目 (休薬:23～35日目)</p> <p>① ボルテゾミブ注(ベルケイド皮下注) 1.3mg/m<sup>2</sup>【皮下注】</p> <p>※ 症状に合わせて1～8サイクル目と同様のスケジュールになる場合があります。<br/>※ 実際の投与スケジュールは症状に合わせて変更される場合があります。</p>  |     |



| レジメコード   | 分類     | レジメ名称                                     | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄  |
|--|--------|---|---|--|
| C90-22<br>C90-23<br>C90-24<br>C90-25<br>C90-26<br>C90-27 | 多発性骨髄腫 | 多発性骨髄腫 CLd(カルフィルゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾン)       | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1～21 日目</p> <p>① レプラミド錠(レナリドミド) 1回25mg 1日1回【内服】</p> <p>1・2、8・9、15・16、22・23日目</p> <p>② デキサメタゾン(レナデックス錠) 1日40mg 1日1～2回【内服】</p> <p>※ カイプロリス注(カルフィルゾミブ)は、以下の投与スケジュールになります。</p> <p>「1～12サイクル」 1・2、8・9、15・16、22・23日目</p> <p>① カイプロリス注 1・2日目→20mg/m<sup>2</sup>、以降27mg/m<sup>2</sup>【注射】</p> <p>「13サイクル～」 1・2、15・16 日目</p> <p>① カイプロリス注 27mg/m<sup>2</sup>【注射】</p>                         | 体表面積2.2m <sup>2</sup> を超える患者は2.2m <sup>2</sup> で算出 |
| C90-29<br>C90-30<br>C90-31<br>C90-32                     | 多発性骨髄腫 | 多発性骨髄腫 Cd(カルフィルゾミブ+デキサメタゾン) 1-2、8-9、15-16 | <p>【1クール 28日間】</p> <p>① カルフィルゾミブ注(カイプロリス)初回の1・2日目→20mg/m<sup>2</sup>、以降56mg/m<sup>2</sup>【注射】</p> <p>1・2、8・9、15・16日目</p> <p>② デキサメタゾン錠(レナデックス) 1日20mg 1日1～2回【内服】</p> <p>1・2、8・9、15・16、22・23日目</p>   | 体表面積2.2m <sup>2</sup> を超える患者は2.2m <sup>2</sup> で算出 |
| C90-33<br>C90-34   | 多発性骨髄腫 | 多発性骨髄腫 Cd(カルフィルゾミブ+デキサメタゾン) 1・8・15        | <p>【1クール 28日間】</p> <p>1・8・15日目</p> <p>① カルフィルゾミブ注(カイプロリス)初回の1日目→20mg/m<sup>2</sup>、以降70mg/m<sup>2</sup>【注射】</p> <p>1・8・15・22日目</p> <p>② デキサメタゾン錠(レナデックス) 1日20mg 1日1～2回【内服】</p> <p>《2サイクル以降》</p> <p>◆ 1・15 日目</p> <p>① イサツキシマブ注(サークリサ) 10mg/kg【注射】</p> <p>◆ 1・8・15・22 日目</p> <p>② デキサメタゾン錠(レナデックス) 1日40mg(75歳以上は20mg) 1日1～2回【内服】</p> <p>◆ 1～21 日目 (22～28日目休薬)</p> <p>③ ポマリドミドカプセル(ポマリスト)1回4mg 1日1回【内服】</p> | 体表面積2.2m <sup>2</sup> を超える患者は2.2m <sup>2</sup> で算出 |

| レジメコード                     | 分類     | レジメ名称                              | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄 |
|----------------------------|--------|------------------------------------|---|-----|
| C90-40<br>C90-41<br>C90-42 | 多発性骨髄腫 | 多発性骨髄腫 DLd(ダラツムマブ+レナリドミド+デキサメタゾン)  | <p>【1クール 28日間】<br/>1～21 日目<br/>① レブラミド錠(レナリドミド) 1回25mg 1日1回【内服】<br/>1・8・15・22日目<br/>② デキサメタゾン【内服または注射】</p> <p>※ ダラキューロ配合注(ダラツムマブ)は、以下の投与スケジュールになります。<br/>「1～2サイクル」 1・8・15・22日目<br/>① ダラキューロ配合注 15mL【注射】<br/>「3～6サイクル」 1・15 日目<br/>① ダラキューロ配合注 15mL【注射】</p> <p>「7サイクル以降」 1 日目<br/>① ダラキューロ配合注 15mL【注射】</p>   |     |
| C90-43<br>C90-44<br>C90-45 | 多発性骨髄腫 | 多発性骨髄腫 D-Bd(ダラツムマブ+ボルテゾミブ+デキサメタゾン) | <p>【1～3サイクル】 21日ごと<br/>1・8・15日目<br/>① ダラツムマブ(ダラキューロ配合皮下注) 15mL<br/>1・4・8・11日目<br/>② ボルテゾミブ注(ベルケイド皮下注) 1.3mg/m<sup>2</sup><br/>1～2・4～5・8～9・11～12・15 日目<br/>③ レナデックス錠(デキサメタゾン)【内服】</p> <p>【4～8サイクル】 21日ごと<br/>1日目<br/>① ダラツムマブ(ダラキューロ配合皮下注) 15mL<br/>1・4・8・11 日目<br/>② ボルテゾミブ注(ベルケイド皮下注) 1.3mg/m<sup>2</sup><br/>1～2・4～5・8～9・11～12 日目<br/>③ レナデックス錠(デキサメタゾン)【内服】</p> <p>【9サイクル以降】 28日ごと 1日目のみ<br/>① ダラツムマブ(ダラキューロ配合皮下注) 15mL<br/>② レナデックス錠(デキサメタゾン)【内服】</p> |     |

| レジメンコード                    | 分類     | レジメン名称                                     | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|----------------------------|--------|--|--|-----|
| C90-50<br>C90-51<br>C90-52 | 多発性骨髄腫 | 多発性骨髄腫 DMPB(ダラツムマブ+ホ®マ®トミブ+メルファラン+デキサメタゾン) | <p>【1クール 42日間】</p> <p>「1サイクル目」1・8・15・22・29・36日目</p> <p>① ダラツムマブ(ダラキューロ配合皮下注)15mL<br/>1・4・8・11日目、22・25・29・32 日目 (休薬:12~21日目、33~42日目)</p> <p>② ボルテゾミブ注(ベルケイド皮下注) 1.3mg/m<sup>2</sup>【皮下注】<br/>1~4 日目</p> <p>③ メルファラン錠(アルケラン) 9mg/m<sup>2</sup> 1日1回+プレドニゾロン錠 60mg/m<sup>2</sup> 1日1回【内服】</p> <p>「2~9サイクル目」<br/>1・22日目</p> <p>① ダラツムマブ(ダラキューロ配合皮下注)15mL<br/>1・8 日目、22・29 日目 (休薬:9~21日目、30~42日目)</p> <p>② ボルテゾミブ注(ベルケイド皮下注) 1.3mg/m<sup>2</sup>【皮下注】<br/>1~4 日目</p> <p>③ メルファラン錠(アルケラン)9mg/m<sup>2</sup> 1日1回+プレドニゾロン錠 60mg/m<sup>2</sup> 1日1回【内服】</p> <p>「10サイクル目以降」<br/>① ダラツムマブ(ダラキューロ配合皮下注) 15mL 1・22日目に投与します。</p> |     |
| C90-57<br>C90-58           | 多発性骨髄腫 | 多発性骨髄腫 IsaKd(イサツキシマブ+カルフィルゾミブ+デキサメタゾン)     | <p>【1クール 28日間】</p> <p>「1サイクル目」<br/>1・8・15・22 日目</p> <p>① イサツキシマブ(サークリサ注) 10mg/kg【注射】2時間30分~1時間45分<br/>1・2、8・9、15・16日目</p> <p>② カルフィルゾミブ(カイプロリス注) 1・2日目→20mg/m<sup>2</sup>、以降→56mg/m<sup>2</sup>【注射】30分<br/>1・2、8・9、15・16、22・23日目</p> <p>③ デキサメタゾン(レナデックス錠) 1日20mg 1日1~2回【内服】</p> <p>「2サイクル以降」<br/>1・15 日目</p> <p>① イサツキシマブ(サークリサ注) 10mg/kg【注射】1時間45分<br/>1・2、8・9、15・16日目</p> <p>② カルフィルゾミブ(カイプロリス注) 56mg/m<sup>2</sup>【注射】30分<br/>1・2、8・9、15・16、22・23日目</p> <p>③ デキサメタゾン(レナデックス錠) 1日20mg 1日1~2回【内服】</p>  |     |
| C90-59<br>C90-60           | 多発性骨髄腫 | 多発性骨髄腫 IsaPd(イサツキシマブ+ホ®マ®トミブ+デキサメタゾン)      | <p>【1クール 28日間】</p> <p>「1サイクル目」<br/>1・8・15・22 日目</p> <p>① イサツキシマブ(サークリサ注) 10mg/kg【注射】2時間30分~1時間45分<br/>1~21日目</p> <p>② ポマリドミド(ポマリストカプセル) 1日4mg 1日1回【内服】<br/>1・8・15・22日目</p> <p>③ デキサメタゾン(レナデックス錠) 1日40mg(75歳以上は20mg) 1日1~2回【内服】</p>   |     |

| レジメンコード          | 分類                | レジメン名称                                    | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|------------------|-------------------|---|--|-----|
|                  |                   |   | 「2サイクル以降」<br>1・15 日目<br>① イサツキシマブ(サークリサ注) 10mg/kg 1日1回【注射】1時間45分<br>1～21日目<br>② ポマリドミド(ポマリストカプセル) 1日4mg 1日1回【内服】<br>1・15・22日目<br>③ デキサメタゾン(レナデックス錠) 1日40mg 1日1～2回【内服】  |     |
| C90-61<br>C90-62 | 多発性骨<br>髄腫        | 多発性骨髄腫 Isa+d(イサツキシマブ+デキサメタゾン)             | 【1クール 28日間】<br>「1サイクル目」<br>1・8・15・22 日目<br>① イサツキシマブ(サークリサ注) 20mg/kg【注射】2時間30分～1時間45分<br>1・8・15・22日目<br>② デキサメタゾン(レナデックス錠) 1日40mg(75歳以上は20mg) 1日1～2回【内服】<br><br>「2サイクル以降」<br>1・15 日目<br>① イサツキシマブ(サークリサ注) 20mg/kg【注射】1時間45分<br>1・15・22日目<br>② デキサメタゾン(レナデックス錠) 1日40mg(75歳以上は20mg) 1日1～2回【内服】 |     |
| C90-63<br>C90-64 | 多発性骨<br>髄腫        | 多発性骨髄腫 Isa(イサツキシマブ)単剤                     | 【1クール 28日間】<br>「1サイクル目」<br>1・8・15・22 日目<br>① イサツキシマブ(サークリサ注) 20mg/kg【注射】2時間30分～1時間45分<br><br>「2サイクル以降」<br>1・15 日目<br>① イサツキシマブ(サークリサ注) 20mg/kg【注射】1時間45分<br><br>1・15・22日目  |     |
| C91-01           | 慢性リン<br>パ性白血<br>病 | 慢性リンパ性白血病 ベンダムスチン<br>100mg/m <sup>2</sup> | 【1クール 28日間】<br>1日目および2 日目<br>① ベンダムスチン注(トレアキシシ) 100mg/m <sup>2</sup> 【60分 点滴静注】  |     |

| レジメンコード  | 分類        | レジメン名称                      | 用法・用量(基本的なスケジュール)  | 備考欄 |
|--|-----------|-----------------------------|--|-----|
| C91-10<br>C91-11<br>C91-12<br>C91-13<br>C91-14<br>C91-15<br>C91-16<br>C91-17 | 急性リンパ性白血病 | 急性リンパ性白血病 プリナツモマブ           | <p>1クール目【1クール 42日間】</p> <p>① デキサメタゾン注 1・8日目 点滴静注</p> <p>② プリナツモマブ(ビーリンサイト注) 28日間持続点滴静注<br/>1日目～7日目 9<math>\mu</math>g/日<br/>8日目～28日目 28<math>\mu</math>g/日</p> <p>2～5クール目【1クール 42日間】</p> <p>① デキサメタゾン注 1日目 点滴静注</p> <p>② プリナツモマブ(ビーリンサイト注) 28<math>\mu</math>g/日 28日間持続点滴静注</p> <p>6～9クール目【1クール 84日間】</p> <p>① デキサメタゾン注 1日目 点滴静注</p> <p>② プリナツモマブ(ビーリンサイト注) 28<math>\mu</math>g/日 28日間持続点滴静注</p> |     |
| C91-18<br>(寛解導入)<br>C91-19<br>(寛解後)  | 急性リンパ性白血病 | 急性リンパ性白血病 イノツマブ オゾガマイシン     | <p>寛解導入【1クール 21日間】</p> <p>① 1・8・15日目</p> <p>イノツマブ オゾガマイシン(ベスポンサ)注 0.8mg/m<sup>2</sup>【60分】</p> <p>寛解後【1クール 28日間】</p> <p>① 1・8・15日目</p> <p>イノツマブ オゾガマイシン(ベスポンサ)注 0.5mg/m<sup>2</sup>【60分】</p> <p>吐気・薬剤による過敏反応などの予防のため、実施前に副作用を予防するための点滴を行います。(15分間)</p>   |     |
| C19-18<br>C19-19   | 急性リンパ性白血病 | 急性リンパ性白血病<br>イノツマブ オゾガマイシン  | <p>寛解導入【1クール 21日間】</p> <p>① 1・8・15日目</p> <p>イノツマブ オゾガマイシン(ベスポンサ)注 1時間点滴</p> <p>寛解後【1クール 28日間】</p> <p>① 1・8・15日目</p> <p>イノツマブ オゾガマイシン(ベスポンサ)注 1時間点滴</p> <p>吐気・薬剤による過敏反応などの予防のため、実施前に副作用を予防するための点滴を行います。(15分間)</p>   |     |
| C91-30   | 急性リンパ性白血病 | 急性リンパ性白血病 MA(メトレキサート+シタラビン) | <p>【1クール 21日間】</p> <p>1日目</p> <p>① メトレキサート注 1000mg/m<sup>2</sup>【24時間 点滴】</p> <p>2～3日目</p> <p>② シタラビン注(キロサイド) 2000mg/m<sup>2</sup>【1回3時間を1日2回投与、合計4回】</p> <p>※ 抗がん薬投与による副作用発現予防のため、治療中は他のお薬も投与します。</p>   |     |

| レジメンコード          | 分類       | レジメン名称                 | 用法・用量(基本的なスケジュール)   | 備考欄 |
|------------------|----------|------------------------|---|-----|
| C92-10<br>C92-11 | 急性骨髄性白血病 | 急性骨髄性白血病 ビキセオス(寛解導入療法) | <p>【1クール 2~5週間】<br/>(1回目) 1日目、3日目、5日目<br/>① ビキセオス(ダウルビシン/シタラビン)配合静注用<br/>100単位/m<sup>2</sup>【90分 中心静脈投与】</p> <p>【1クール 5~8週間】<br/>(2回目) 1日目、3日目<br/>① ビキセオス(ダウルビシン/シタラビン)配合静注用<br/>100単位/m<sup>2</sup>【90分 中心静脈投与】<br/>※ 点滴ポンプ使用します※ 薬剤の効果を判定した後、2回目の治療を行うかどうかの判断をします。</p>   |     |
| C92-12           | 急性骨髄性白血病 | 急性骨髄性白血病 ビキセオス(地固め療法)  | <p>【1クール 5~8週間】<br/>(2回目) 1日目、3日目<br/>① ビキセオス(ダウルビシン/シタラビン)配合静注用<br/>65単位/m<sup>2</sup>【90分 中心静脈投与】</p> <p>※ 点滴ポンプ使用します</p>   |     |
| D40-01           | 精巣腫瘍     | 精巣腫瘍BEP                | <p>1日目 プレオマイシン(プレオ)注 30mg/回 【30分 点滴静注】<br/>エトホシド注 100mg/m<sup>2</sup> 【2時間 点滴静注】<br/>シスプラチン注 20mg/m<sup>2</sup> 【2時間 点滴静注】</p> <p>2~5日目 エトホシド注 100mg/m<sup>2</sup> 【2時間 点滴静注】<br/>シスプラチン注 20mg/m<sup>2</sup> 【2時間 点滴静注】</p> <p>8・15日目 プレオマイシン(プレオ)注 30mg/m<sup>2</sup> 【30分 点滴静注】</p> <p>21日(3週間)を1クールとして繰り返します</p> |     |
| D40-03           | 精巣腫瘍     | 精巣腫瘍 カルボプラチン単剤         | <p>1日目 カルボプラチン注 AUC7 【1時間 点滴静注】(最大投与量900mg)<br/>4週間を1クールとして繰り返します</p> <p>※投与前に吐気止めの点滴をします。</p>  |     |