

《手術前後の投与に注意を要する薬剤》 女性ホルモン関連製剤

卵胞ホルモン製剤は、血液凝固能力を上昇させる作用をもっているため、血栓症のリスクを高める恐れがあります。

分類	一般名	薬品名	術前休業期間	術後再開の目安
骨粗鬆症治療薬 (SERM)	ラロキシフェン塩酸塩	エビスタ錠(先) ラロキシフェン塩酸塩錠(後)	3日間 ^③	完全に歩行可能となつてから ^③
	パゼドキシフェン酢酸塩	ビビアント錠(先) パゼドキシフェン錠(後)		
子宮内膜症治療薬	ダナゾール	ボンゾール錠	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する	
	ジエノゲスト	ディナゲスト錠 ジエノゲスト錠		
卵胞ホルモン	エストラジオール	エストラーナテープ	4週間 ^④	完全に歩行可能となつてから ^④
		ル・エストロジェル		
		デイビゲル		
	エストリオール	ジュリナ錠		
		ホーリン錠		
		エストリール錠		
結合型エストロゲン	プレマリン錠	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する		
エストラジオール吉草酸エステル	プロギノン・デポー筋注 ペラニンデポー筋注			
抗がん剤 (卵胞ホルモン)	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム	エストラサイトカプセル	4週間 ^①	術後2週間 ^①
	エチニルエストラジオール	プロセキソール錠		
黄体ホルモン	プロゲステロン	プロゲホルモン筋注用	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する	
		プロゲステロン筋注		
		ルティナス錠		
		ウトロゲスタン腫用カプセル		
		ワンクリノン腫用ゲル		
		ルテウム腫用坐剤		
	エフメノカプセル			
	ジドロゲステロン	デュファストン錠		
	ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル	プロゲデポー筋注		
	ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル	プロゲストーンデポー筋注		
	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	プロベラ錠		
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠			
クオルマジン酢酸エステル	ルトラール錠			
ノルエチステロン	ノアルテン錠			
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	ヒスロン錠5	休業の必要なし ^③ ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討	術後1週間 ^③	
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	ヒスロンH錠200mg			
卵胞・黄体ホルモン配合剤	ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル・エストラジオール安息香酸エステル	ルテスデポー注	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する	
	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	プラノバル配合錠		
	エストラジオール・ノルエチステロン	メノエイドコンビパッチ		
月経困難症 (卵胞・黄体ホルモン配合剤)	エストラジオール・レボノルゲストレル	ウェールナラ配合錠	4週間 ^②	術後2週間 ^②
	ドロスピレノン	ヤーズ配合錠		
	エチニルエストラジオール	ヤーズフレックス配合錠		
	ノルエチステロン	ルナベル配合錠LD、ULD		
低用量ピル (卵胞・黄体ホルモン配合剤)	エチニルエストラジオール	フリウエル配合錠LD、ULD	4週間 ^{②③}	術後2週間 ^{②③}
	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	ジェミーナ配合錠		
	シンフェーズT28錠			
	アンジュ21錠、28錠			
緊急避妊薬	レボノルゲストレル	トリキュラー錠21、28	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する	
	レボノルゲストレル	ラベルフィーユ21錠、28錠		
子宮内黄体ホルモン放出シス	レボノルゲストレル	マーベロン21、28	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する	
	レボノルゲストレル	ファボワール錠21、28		
排卵誘発剤	レボノルゲストレル	ノルレボ錠	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する	
	シクロフェニル	ミレーナ52mg		
GnRH アゴニスト	クロミフェンクエン酸	セキソビット錠	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する	
	ブセレリン酢酸塩	クロミッド錠		
	ブセレリン酢酸塩	スプレキュア点鼻液		
	ナファレリン酢酸塩	ブセレリン点鼻液		
	ナファレリン酢酸塩	ナサニール点鼻液		
	ナファレリン酢酸塩	ナファレリン点鼻液		
GnRH アンタゴニスト	ゴセレリン酢酸塩	ゾラデックス1.8mgデポ	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する	
	リュープロレリン酢酸塩	リュープリン注射用1.88mg		
女性・男性ホルモン配合剤	リュープロレリン酢酸塩	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する	
	セトロリック酢酸塩	セトロタイド注射用		
アロマトーゼ阻害薬	ガニレリクス酢酸塩	セトロタイド皮下注	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する	
	レルゴリクス	ガニレスト錠		
	レルミナ錠			
アロマトーゼ阻害薬	テストステロンエナント酸エステル・エストラジオール吉草酸エステル	プリモジアン・デポー筋注	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する	
	アナストロゾール	ダイホルモン・デポー注		
	レトロゾール	アリミデックス錠(先)		
		アナストロゾール錠(後)		
アロマトーゼ阻害薬	フェマーラ錠(先)	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する		
	レトロゾール錠(後)			

料： ①メーカー回答 ②HRTガイドライン2017 ③添付文書、インタビューフォーム ④プレマリン錠の添付文書より統一