








手術前に休薬する薬剤及び休薬期間（糖尿病薬）

【SGLT2阻害薬】

一般名	先発医薬品	後発医薬品	外観		休薬期間
イプラグリフロジン L-プロリン	スーグラ錠 25 mg・50 mg	なし			3日
エンパグリフロジン	ジャディアンス錠 10 mg・20 mg	なし			3日
カナグリフロジン水和物	カナグル錠 100 mg	なし			3日
ダバグリフロジンプロピレン グリコール水和物	フォーシガ錠 5 mg・10 mg	なし			3日
トホグリフロジン水和物	デベルザ錠 20 mg	なし			3日
ルセオグリフロジン水和物	ルセフィ錠 25 mg	なし			3日
イプラグリフロジン L-プロリン/ シタグリブチンリン酸塩水和物	スージャヌ配合錠	なし			3日
エンパグリフロジン/リナグリブチン	トラディアンス配合錠 AP・BP	なし			3日
カナグリフロジン水和物/ テネリグリブチン臭化水素酸塩 水和物	カナリア配合錠	なし			3日

【ビグアナイド系薬】

一般名	先発医薬品	後発医薬品	外観		休薬期間
メトホルミン	メトグルコ錠 250 mg・500 mg	メトホルミン塩酸塩錠 250 mg・500 mg			3日
	エクメット配合錠 LD・HD	なし			3日
	イニシンク配合錠	なし			3日
	メトアナ配合錠 LD・HD ※当院非採用薬	なし			3日

SGLT2阻害薬、ビグアナイド系薬 共に添付文書で術前術後の投与が禁忌となっています

【参考文献】

- ・糖尿病患者の周術期管理 日臨麻会誌 Vol.32 No.7, 842~850, 2012
- ・日本糖尿病協会 糖尿病治療におけるSGLT2阻害薬の適正使用に関する Recommendation 2014年6月13日策定；2022年7月26日改訂
- ・日本腎臓学会 CKD 治療におけるSGLT2 阻害薬の適正使用に関する Recommendation 2022 年11月29日
- ・日本循環器学会・日本心不全学会 心不全治療における SGLT2 阻害薬の適正使用に関する Recommendation 2023年06月16日

【使用上の注意】

- 血糖コントロールに懸念がある症例は 事前に糖尿病内分泌科に紹介

令和7年9月（第2版）

いわき市医療センター

薬事委員会・医療安全管理委員会