


















入院診療計画書 疾患名: 突発性難聴の治療を受けられる

様へ

経過 月日	入院当日～4日目 / ~ /	退院は5日目～8日目 / ~ /
治療 処置	ステロイド剤の点滴治療をはじめます。注入時間は3～5時間です 点滴内のステロイド剤は徐々に減量し、4日目に点滴終了します 	ステロイド剤は飲み薬に変更になります 医師より退院許可があれば退院です 外来で引き続き経過を見ます  
内服薬	胃薬とビタミン剤のお薬を飲みます 薬剤師から内服薬について説明があります 	プレドニン(ステロイド剤)のお薬を飲み始めます 日を追ってプレドニンは徐々に減量となります  
検査	空腹時の血糖値を測定します。(7時・11時・16時) 聴力検査がある場合もあります(外来の聴力検査室で行います) 	
食事	普通のご飯がでます 軟らかいおかず、お粥を希望の際は看護師に知らせて下さい 血糖値が上昇し治療に影響するので間食・ジュースは控えて下さい    	
安静	院内は自由ですが、ステロイド治療中は感染しやすい状態にあるため、なるべくお部屋でお過ごし下さい お部屋を出る際はマスク着用・手洗いをして下さい  	
清潔	入院当日より点滴終了後シャワー浴ができます 	シャワー浴ができます 
説明	看護師から入院生活について説明があります 診断書・証明書が必要な方はお早めに看護師にお知らせください 何かあれば気兼ねなく看護師に声をかけてください。 	薬剤師よりプレドニンの飲み薬について説明があります 会計後に次回外来の説明があります 保険の診断書が必要な方は文書窓口に提出してください 退院後も引き続きマスク着用・手洗い・入浴を行い感染を予防してください 担当医: 西山 みなみ 看護師: 患者・家族: 
		令和 年 月 日

※状況に応じて、予定が変更になる場合があります。ご不明な点がございましたら、お尋ねください。